

CONTRAHIST ALLERGY 5 mg 10 tabletek, alergia, katar, świąd

Cena: 7,15 PLN



Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

CONTRAHIST ALLERGY 10 tabletek ADAMED

Wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Sposób użycia

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 6 lat: 5mg (1 tabletki powlekana) 1x na dobę.

Ważne

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyiny, benzoesan sodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie

zaburzenia czynności nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Tabletek nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Skład

Każda tabletki powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodoru, co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny oraz jako substancję pomocniczą 68,2 mg laktozy jednowodnej.