


ELEKTROLITY 7 saszetek o smaku truskawkowym



Cena: 10,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	7 sasz.
Postać	prosz.
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

O produkcie Czy wiesz, że... Sprawdź też Szczegóły produktu

O PRODUKCIE

Elektrolity są przeznaczone do postępowania w bieguncie i stanach odwodnienia.

Poprzez zmniejszoną osmolarność promują wchłanianie wody ze światła jelit.

Proporcje **solii mineralnych** uzupełnionych **glukozą** sprawiają, że transport wody do komórek jest bardziej efektywny.

Elektrolity są dostępne w formie proszku do rozpuszczania w wodzie o smaku truskawkowym i pomarańczowym.

CZY WIESZ, ŻE...

Objawami stanów odwodnienia mogą być:

- **suchość w ustach**
- **brak oddawania moczu**
- **silne pragnienie.**

Dzięki **Elektrolitom** rekomendowanym przez **Stoperan** więcej wody przechodzi do tkanek. Tym samym stosowanie ich w trakcie biegunki zmniejsza ryzyko odwodnienia.

Elektrolity rekomendowane przez **Stoperan** mogą być stosowane przez:

dzieciod 3 roku życia

dorosłych

osoby w podeszłym wieku

Elektrolity rekomendowane przez **Stoperan** są zalecane do postępowania dietetycznego w **bieguncie**, której może towarzyszyć stan

odwodnienia.

Ostrożność powinni zachować: • chorzy z **cukrzycą** (z uwagi na zawartość glukozy) • chorzy leczący **nadciśnienie spirolonaktonem** lub **inhibitorami AC** (z uwagi na zawartość sodu i potasu)

Elektrolity należy podawać od pierwszej chwili wystąpienia biegunki (a także wymiotów).

Dawkowanie Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w 200ml wody i podawać małymi porcjami.

Płynu **nie należy** dodatkowo dosładzać.

ZAWSZE STOSUJ ELEKTROLITY PRZY BIEGUNCE

SPRAWDŹ TEŻ

*

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Skład

Działanie

Wskazania

Przeciwwskazania

Dawkowanie i sposób użycia

(1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat pomarańczowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza. (1 saszetka): glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat truskawkowy, substancja słodząca: acesulfam K, sukraloza.

Elektrolity rekomendowane przez Stoperan dostarczają organizmowi niezbędnych składników do nawodnienia.

Do postępowania dietetycznego w biegunce, w którym: uzupełnia elektrolity utracone podczas biegunki.

Wstrząs hemodynamiczny. Niedrożność jelit. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Produkt należy przyjmować pod nadzorem lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego.

Każdą saszetkę rozpuścić 200ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3-4 godziny, podczas których zastosować: 1000ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15kg masy ciała; 1400ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 1000ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. Płyn nie należy dosładzać.

*Stoperan, 2 mg, kapsułki twarde. Postać: kapsułki twarde Wskazania: Stoperan jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i przewlekłej biegunki. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci w wieku powyżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Właściwości ELEKTROLITY 7 saszetek o smaku truskawkowym Elektrolity rekomendowane przez Stoperan zalecane są do postępowania dietetycznego w biegunce i stanach odwodnienia, by efektywnie nawodnić organizm i przywrócić równowagę wodno-elektrolitową. mają skład zgodny z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obniżona osmolarność produktu do 245 mOsm/l wspomaga przenikanie elektrolitów i wody przez ścianę jelita, dostarczają energii. Produkt może być stosowany przez: osoby z biegunką infekcyjną, w tym wirusową (np. tzw. grypę żołądkową lub jelitówkę) cierpiące na biegunki przewlekłe, kobiety w ciąży i matki karmiące, dzieci powyżej 3. roku życia i osoby dorosłe osoby starsze. Produkt musi być stosowany pod nadzorem lekarza. **Sposób użycia** Każdą saszetkę rozpuścić w 200 ml wody. Nawodnienie prowadzić przez 3–4 godziny, podczas których zastosować: 1000 ml przygotowanego płynu (5 saszetek) u dzieci do 15 kg masy ciała; 1400 ml przygotowanego płynu (7 saszetek) u dzieci powyżej 15 kg masy ciała i osób dorosłych. Płyn należy podawać małymi porcjami, a w przypadku wymiotów wręcz łyżeczką. Po tym czasie podawać płyn w ilości 100 ml po każdym luźnym wypróżnieniu lub wymiotach. **Ważne** Produkt zawiera glukozę – chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność. Produkt zawiera sód i potas – osoby leczone z powodu nadciśnienia (spironolaktonem lub inhibitorami ACE) powinny zachować ostrożność. Nie stosować przy: wstrząsie hemodynamicznym, niedrożności jelit, nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. **Składnik** glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam. Produkt zawiera cukier i substancje słodzące. **Producent** USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

Galeria

DOBRY SMAK

Pomarańcza

Truskawka

Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Stoperan rekomenduje
Elektrolyty

MOGĄ BYĆ STOSOWANE W:

biegunce

stanach odwodnienia

Skład zgodny z rekomendacją WHO¹

Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego

NA ODWODNIENIE W BIEGUNCE

1 WHO, 2 WHO, 3 WHO, 4 WHO, 5 WHO, 6 WHO, 7 WHO, 8 WHO, 9 WHO, 10 WHO, 11 WHO, 12 WHO, 13 WHO, 14 WHO, 15 WHO, 16 WHO, 17 WHO, 18 WHO, 19 WHO, 20 WHO, 21 WHO, 22 WHO, 23 WHO, 24 WHO, 25 WHO, 26 WHO, 27 WHO, 28 WHO, 29 WHO, 30 WHO, 31 WHO, 32 WHO, 33 WHO, 34 WHO, 35 WHO, 36 WHO, 37 WHO, 38 WHO, 39 WHO, 40 WHO, 41 WHO, 42 WHO, 43 WHO, 44 WHO, 45 WHO, 46 WHO, 47 WHO, 48 WHO, 49 WHO, 50 WHO, 51 WHO, 52 WHO, 53 WHO, 54 WHO, 55 WHO, 56 WHO, 57 WHO, 58 WHO, 59 WHO, 60 WHO, 61 WHO, 62 WHO, 63 WHO, 64 WHO, 65 WHO, 66 WHO, 67 WHO, 68 WHO, 69 WHO, 70 WHO, 71 WHO, 72 WHO, 73 WHO, 74 WHO, 75 WHO, 76 WHO, 77 WHO, 78 WHO, 79 WHO, 80 WHO, 81 WHO, 82 WHO, 83 WHO, 84 WHO, 85 WHO, 86 WHO, 87 WHO, 88 WHO, 89 WHO, 90 WHO, 91 WHO, 92 WHO, 93 WHO, 94 WHO, 95 WHO, 96 WHO, 97 WHO, 98 WHO, 99 WHO, 100 WHO

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Zawartość 1 saszetki należy rozpuścić w 200 ml wody

Stoperan rekomenduje
Elektrolyty

Osmolarność 245 mOsm/l

W BIEGUNCE I STANACH ODWODNIENIA:

- nawadnia podczas biegunki
- uzupełnia straty elektrolitów
- dostarcza energii

SKŁAD

Skład 1 saszetki: glukoza 2,70 g, cytrynian sodu 0,58 g, chlorek sodu 0,52 g, chlorek potasu 0,3 g, aromat truskawkowy, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, substancje słodzące: acesulfam K, aspartam. Produkt Elektrolyty smak truskawkowy zawiera cukier i substancje słodzące.

Wartość odżywcza/składniki produktu	w 100 ml płynu	w 200 ml płynu (1 saszetka)
Wartość energetyczna	24 kJ/6 kcal	48 kJ/12 kcal
Tłuszcz, w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	0 g
Węglowodany	1,4 g	2,8 g
- w tym cukry	1,4 g	2,8 g
Białko	0 g	0 g
Sól	0,26 g	0,52 g
Sód	170 mg	340 mg
Potas	79 mg	158 mg
Chlorki	229 mg	458 mg
Cytrynian	186 mg	372 mg