

## ERDOMED MUKO 225 mg proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 10 saszetek



Cena: 15,29 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	0,225 g
Opakowanie	10 sasz.
Postać	prosz. do sp. zaw. doust.
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Erdosteinum

### Opis produktu

#### Opis

Na kaszel mokry? Na zatłkane zatłki? Erdomed Muko.

Jak działa ERDOSTEINA? Kiedy stosować ERDOMED MUKO? Bezpieczny dla żołądka Dawkowanie Co wyróżnia ERDOMED MUKO? Szczegóły produktu

zawiera ERDOSTEINĘ - najnowszą substancję leczniczą<sup>1</sup> o szerokim spektrum działania:

lek OTC

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

Zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny, ułatwia jej usuwanie z dróg oddechowych.

Zmniejsza częstość i natężenie uporczywego kaszlu.

Zmniejsza przyleganie bakterii do nabłonka dróg oddechowych, dzięki czemu **minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej.**

Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.

Zwiększa stężenie antybiotyku w wydzielinie, co **poprawia efektywność antybiotykoterapii.**

Kiedy zastosować ?

Lek jest stosowany w celu **rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszania śluzowej wydzieliny** z dróg oddechowych.

2ChLP Erdomed Muko

jest **BEZPIECZNY DLA ŻOŁĄDKA**.

Erdosteina to **PROLEK**, który w formie nieaktywnej przechodzi przez przewód pokarmowy. Dzięki temu **nie wywiera wpływu na błonę śluzową żołądka**.

Może być **bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy**.

3Kupaj A., Fornal R., Kurzawa R., Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej, Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 12, 18-24

Dawkowanie

Dorośli 1 saszетка 2-3 x na dobę

Dzieci > 12 r.ż. 1 saszетка 2 x na dobę

Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.

Jak przygotować?

Zawartość saszetki rozpuścić w pół szklanki (120 ml) wody o temperaturze pokojowej. Podanie doustne.

Co wyróżnia ?

**Najnowsza substancja lecznicza** o szerokim spektrum działania. **Ułatwia odkrztuszenie** zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych. **Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej**. **Zmniejsza** częstość i natężenie **uporczywego kaszlu**. **Bezpieczny dla żołądka**, podawany w formie nieaktywnego proleku. **Przyjazna dla dzieci (od 12 r.ż.) i dorosłych** postać pomarańczowego płynu, który dodatkowo **nawadnia organizm**.

1 IQVIA, Dataview, R05C, 2020

dostępny w dwóch wariantach opakowania

lek OTC

1 opakowanie wystarcza na 1 pełną terapię

lek OTC

Sprawdź dostępność

Szczegóły produktu

Skład

Wskazania

Stosowanie

Przechowywanie

Inne informacje

Skład

**Substancją czynną leku jest erdosteina.** Jedna saszетка zawiera 225 mg erdosteiny. Pozostałe składniki to: sacharoza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemu dwutlenek, sukraloza (E 955), kwas jabłkowy bezwodny, aromat pomarańczowy [maltodekstryna kukurydziana, substancje aromatyzujące (w tym, między innymi cytral, alkohol benzylowy, linalol),  $\alpha$ -tokoferol (E 307)].

Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Lek Erdomed Muko dostępny w dwóch wielkościach opakowania: 10 i 20 saszetek.

Wskazania

Erdomed Muko zawiera substancję czynną erdosteinę, która należy do grupy leków mukolitycznych, zmniejszających lepkość śluzu w drogach oddechowych i ułatwiających jego wykrztuszenie.

Erdomed Muko jest stosowany w celu rozrzedzenia i ułatwienia wykrztuszenia śluzowej wydzieliny z dróg oddechowych, jako lek wspomagający w leczeniu ostrych i przewlekłych schorzeń dróg oddechowych, takich jak stany zapalne nosa, zatok, krtani, tchawicy, oskrzeli oraz płuc.

Stosowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Zalecana dawka**

**Stosowanie u dzieci od 12. roku życia:** 1 saszетка 2 razy na dobę.

**Stosowanie u dorosłych:** 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę.

Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

**Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:** Nie jest wymagane korygowanie dawek u dorosłych w przypadku umiarkowanej niewydolności nerek (klirens kreatyniny  $>25$  ml/min).

**Stosowanie leku Erdomed Muko u pacjentów w podeszłym wieku:** Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w wieku powyżej 65 lat.

## Sposób użycia

Zawartość saszetki wsypać do ok. 120 ml (pół standardowej szklanki) wody o temperaturze pokojowej, w razie potrzeby zamieszać do uzyskania rzadkiej, mętnej zawiesiny. Stosować doustnie, bezpośrednio po przygotowaniu, według powyższego schematu dawkowania.

**Leku nie należy stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas snu.**

**Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.**

## Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

## Inne informacje

### **Kiedy nie stosować leku Erdomed Muko:**

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), albo na substancje zawierające wolne grupy SH (np.: acetylocysteinę); jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby; jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (klirens kreatyniny)

Galeria

**ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**  
 zawiera **erdosteinę - najnowszą substancję leczniczą\***  
 o szerokim spektrum działania:

- Ułatwia usuwanie wydzieliny z dróg oddechowych
- Zmniejsza intensywność kaszlu
- Minimalizuje ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnej
- Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie

**TERAZ BEZ RECEPTY**

\*EMA, Działanie, RDC, 2020. EN45/1/21

Kiedy stosować **ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**  
**Leczenie wspomagające w:**

- w ostrych infekcjach górnych dróg oddechowych: kichawicy, sinusitach, płuc z nadmiernym wydzielaniem śluzu.
- w przewlekłych infekcjach górnych i dolnych dróg oddechowych z nadmiernym wydzielaniem śluzu.

\*ChP, Erdomed Muko. EN45/1/21

Dawkowanie **ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**

- Dorośli**  
1 saszetka 2-3 x na dobę
- Dzieci > 12 r.ż.**  
1 saszetka 2 x na dobę

Jak przygotować Erdomed Muko?  
 Zawartość saszetki rozpuścić w pół szklanki (120 ml) wody o temperaturze pokojowej.

lek OTC. EN45/1/21

Erdosteina to **PROLEK**, który nie wywiera wpływu na błonę śluzową żołądka.

**BEZPIECZNY DLA ŻOŁĄDKA**  
 Może być bezpiecznie stosowany u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy.

\*Kupaj A, Fornal B, Kuratowa B. Zastosowanie erdosteiny w codziennej praktyce lekarskiej. Świat Medycyny i Farmacji, 2019, 12, 56-57. EN45/1/21

**10** saszetek **1 opakowanie wystarczy na 1 pełną terapię**

**ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**  
 10 saszetek

lek OTC. EN45/1/21

**ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**  
 dostępny w dwóch wariantach opakowania

**10** saszetek **20** saszetek

**ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**  
 10 saszetek **ERDOMED<sup>®</sup>MUKO**  
 20 saszetek

lek OTC. EN45/1/21