

HASCOSEPT o smaku cytrynowo-miodowym 24 pastylki



Cena: 15,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka	3 mg
Opakowanie	24 pastyl. (blist.PVC/PVDC/Alu)
Postać	pastyl.twarde
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Opis<!DOCTYPE HTML>

smak cytrynowo-miodowy

Podwójne działanie- pełne zwycięstwo!

Dlaczego pastylki?

Hascosept to lek, który zwalcza objawy, a gdy inni na tym kończą on działa dalej – zwalcza też przyczynę.¹

pastylki - kompleksowy lek na ból gardła

¹ Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept, pastylki twarde, pkt. 5.1.:Hascosept wykazuje działanie antyseptyczne.

to sprawdzony i bezpieczny lek na gardło.²

Zawiera benzydaminę - substancję o działaniu potwierdzonym badaniami klinicznymi.

Może być stosowany u dzieci od 6-tego roku życia i osób dorosłych.³

Może być stosowany przez diabetyków. Nie zawiera cukru.

O delikatnym miodowo – cytrynowym smaku.

² Benzydamina to substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła – stosowana od niemal 60 lat. ³ Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept smak cytrynowo - miodowy, 3 mg, pastylki twarde. Data zatwierdzenia 01.2020.

Jak działa ?

Zawiera chlorowodorek benzydamininy.¹

Działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie - hamuje syntezę prostaglandyn, substancji odpowiedzialnych za powstanie stanu zapalnego i bólu.

Działa przeciwobrzękowo - zmniejsza obrzęk i przepuszczalność naczyń krwionośnych.

Działa odkażająco – wykazuje miejscowe działanie antyseptyczne.

Działa miejscowo znieczulająco - blokuje przewodzenie bodźców bólowych.

¹ Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept, pastylki twarde, pkt. 5.1.:Hascosept wykazuje działanie antyseptyczne.

Dla kogo pastylki?
Uniwersalne rozwiązanie na każdy ból gardła

„Drapanie, ból i trudności w przełykaniu. U nas powtarza się to kilka razy w roku. Zaczynają chorować dzieciaki, a potem my z mężem.”

Hascosept pastylki mogą być stosowane u dzieci od 6. roku życia oraz u dorosłych.

„Praca i rodzina są dla mnie najważniejsze. Nie mogę chorować. Potrzebuję czegoś co szybko pomoże na ból gardła.”

Hascosept szybko przynosi ulgę. Niweluje stan zapalny, zwalcza ból i obrzęk.

„Na co dzień pracuję głosem. Nie mogę sobie pozwolić na dłuższą niedyspozycję. Potrzebuję efektywnego rozwiązania na pierwsze objawy bólu gardła.”

Hascosept leczy objawy bólu gardła i zwalcza jego przyczyny.

- wybierz lek na gardło w formie, którą lubisz

pastylki: smak miętowy smak cytrynowo-miodowy

Hascosept - spray

Hascosept Forte - spray

Hascosept - płyn do płukania gardła

SPRAWDŹ

Szczegóły produktu pastylki

Skład Opakowanie Stosowanie Przechowywanie Inne informacje

Skład:

1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: izomalt(E 953), acesulfam potasowy(E 950), kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat cytrynowy, aromat miodowy, żółcień chinolinowa (E 104).

Postać farmaceutyczna:

pastylki twarde do ssania; postać okrągłych pastylek barwy żółtej o cytrynowo – miodowym smaku.

Opakowanie:

24 pastylki twarde w opakowaniu.

Stosowanie:

Lek przeznaczony jest do ssania.

Dorośli i dzieci powyżej 6 lat:

Zalecana dawka to 1 pastylka 3 razy na dobę. Pastylkę należy ssać powoli. Nie żuć ani nie połykać. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Stosowanie u dzieci:

Ze względu na postać farmaceutyczną lek Hascosept smak cytrynowo - miodowy nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat, lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

Przechowywanie: Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w blistrze w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Inne informacje:

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przeciwwskazania:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie zaleca się stosowania leku, jeśli u pacjenta występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy (aspirynę) lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowała astma oskrzelowa, gdyż może on spowodować duszność. U niektórych pacjentów owrzodzenie jamy ustnej i gardła może być jedynie objawem innego ciężkiego procesu chorobowego. W przypadku gdyby objawy nasilały się lub nie ustępowały po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Hascosept smak cytrynowo – miodowy a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Nie badano oddziaływania leku Hascosept pastylki z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Hascosept smak cytrynowo - miodowy nie należy stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Miejscowe stosowanie benzydaminu w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Hascosept smak cytrynowo – miodowy zawiera izomalt

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przedawkowanie

Bardzo rzadko donoszono o objawach przedawkowania (pobudzenie, drgawki, potliwość, niezborność, drżenie, wymioty) u dzieci, po spożyciu leków zawierających benzydaminę w dawkach około stukrotnie większych niż dawka zawarta w pojedynczej pastylce.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Hascosept smak cytrynowo - miodowy

W razie przypadkowego zażycia zbyt dużej liczby pastylek, należy natychmiast udać się do lekarza, biorąc ze sobą opakowanie leku. Lekarz wdroży odpowiednie postępowanie.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Hascosept smak cytrynowo - miodowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działaniami niepożądanymi o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) są reakcje alergiczne, które mogą być ciężkie. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

napły obrzęk jamy ustnej lub gardła, trudności w oddychaniu, wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmuje całe ciało.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób): reakcje skórne w wyniku nadwrażliwości na światło.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): pieczenie lub suchość w jamie ustnej. W razie wystąpienia tych objawów, można je zmniejszyć wypijając szklankę wody powoli, małymi łykami.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): skurcz krtani.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu, reakcja alergiczna (nadwrażliwość), ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu, ból lub ucisk w klatce piersiowej i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; reakcja taka może zagrażać życiu, niedoczulica jamy ustnej (miejscowa utrata wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław Informacja o leku tel. 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

1 Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept, pastylki twarde, pkt. 5.1.: Hascosept wykazuje działanie antyseptyczne 2 Benzydamina to substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła – stosowana od niemal 60 lat. 3 Charakterystyka Produktu Leczniczego Hascosept smak cytrynowo-miodowy, 3 mg, pastylki twarde. Data zatwierdzenia 01.2020.

Hascosept smak cytrynowo-miodowy, 3 mg, pastylki twarde. Hascosept smak miętowy, 3 mg, pastylki twarde. Skład: 1 pastylka zawiera 3 mg benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminę. **Postać farmaceutyczna:** pastylki twarde. **Wskazania do stosowania:** Produkt leczniczy jest wskazany u dorosłych i dzieci powyżej 6 lat w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Hascosept 1,5 mg/g roztwór do stosowania w jamie ustnej. Skład: 100 g roztworu zawiera benzydaminę chlorowodorek (Benzydaminę hydrochloridum) 0,15 g. **Postać farmaceutyczna:** roztwór do stosowania w jamie ustnej. **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Hascosept Forte, 3 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Skład: 1 ml roztworu zawiera: 3 mg benzydaminę chlorowodoru (Benzydaminę hydrochloridum). Pojedyncza dawka aerozolu (0,14 ml) zawiera 0,42 mg benzydaminę chlorowodoru. **Postać farmaceutyczna:** aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. **Wskazania do stosowania:** Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj.: w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w zapaleniu krtani, w zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **Podmiot odpowiedzialny:** PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

2020_0910a

</html>

Galeria



Hasco sept
smak cytrynowo-miodowy
3 mg, pastylki twarde benzydamin hydrochloridum

Lek na ból gardła
o miejscowym działaniu:
• przeciwpalnym
• przeciwobrzętkowym
• antyseptycznym

24 pastylki

BEZ CUKRU
24

STOP
Czy Twój lek
nie działa tylko
na pół
gwizdka?

Hasco sept

Hascosept to lek, który
zwalcza objawy,
a gdy inni na tym
kończą on działa dalej
– zwalcza też przyczyny.^{1,2}

Hasco sept
smak cytrynowo-miodowy

- Działanie benzydamin potwierdzone badaniami klinicznymi.
- Dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.³
- Bez cukru. Może być stosowany przez diabetyków.

Wybierz smak,
który lubisz



Hasco sept smak cytrynowo-miodowy

Hasco sept smak miętowy

cytrynowo - miodowy **miętowy**