


BRAUNOVIDON maść 0,1 g/g 20 g DELFARMA

Cena: 23,70 PLN



Opis słownikowy

Dawka	100 mg/g
Opakowanie	20 g (tub.)
Postać	maść
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Polyvidonum

Opis produktu

WskazaniaLek Braunovidon ma postać maści do stosowania na skórę. Lek zawiera substancję czynną powidon jodowany.Lek jest stosowany jako środek dezynfekujący do wielokrotnego użycia przez określony czas.**Działanie**Lek Braunovidon jest wskazany w przypadkach oparzenia skóry płomieniem lub gorącym płynem, na zakażone owrzodzenia, odleżyny, zakażone powierzchowne ubytki skóry niewykazujące tendencji do gojenia się z odczynem zapalnym lub głębszym owrzodzeniem, ropne zmiany skórne (pyodermia), choroby skóry bakteryjnego lub grzybiczego pochodzenia, względnie wtórne zakażenia tym samym czynnikiem uprzednio wyleczone.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.Maść nakłada się kilka razy dziennie na wymagającą leczenia powierzchnię skóry.W początkowej fazie leczenia, dla utrzymania optymalnego działania bakteriobójczego, maść należy nakładać co 4-6 godzin na zakażoną lub sączącą się ranę.Czas stosowania leku Braunovidon uzależniony jest od stanu klinicznego pacjenta.Maść może pozostawać na skórze przez długi czas. Opatrunek należy zmienić w momencie odbarwienia brązowego koloru maści.Aby maść działała skutecznie, należy dokładnie pokryć całą powierzchnię rany.W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.DzieciNie stosować u noworodków, zwłaszcza u wcześniaków oraz u niemowląt do 6 miesiąca życia.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Braunovidon:jeśli pacjent ma uczulenie na powidon jodowany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),w chorobie tarczycy,w przypadku zespołu opryszczkowego zapalenia skóry (rzadka choroba skórna objawiająca się pieczeniem, swędzeniem i innymi objawami, przede wszystkim na skórze rąk, nóg, ramion i pośladkach),w razie planowania lub niedawno zakończonej terapii radioaktywnym izotopem jodu (do czasu zakończenia terapii).u noworodków i niemowląt do 6 miesiąca życia.**Skład**Substancja czynna: powidon jodowany z 10% zawartością dostępnego jodu.100 g maści zawiera 10 g powidonu jodowanego.Substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 4000, woda oczyszczona, sodu wodorowęglan.Jak wygląda lek Braunovidon i co zawiera opakowanieLek ma postać maści o brązowej barwie.Tuby polietylenowe zawierające 20 g lub 100 g maści, w tekturowym pudełku.W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego lub importera równoległego.