DAFURAG MAX 100 mg 30 tabletek

Cena: 13,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,1 g
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Furazidinum

Opis produktu

WskazaniaDAFURAG MAX 100 mg 30 tabletekPierwsza tabletka z furaginą w podwójnej dawce*Wskazaniem do stosowania leku Dafurag max jest zakażenie dolnych dróg moczowych.Jeśli po upływie 7-8 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarzem.* DaFurag max zawiera 100 mg furazydyny w jednej tabletce, tj. podwójną dawkę w porównaniu do tych innych dostępnych w Polsce leków (zarówno dostępnych bez recepty, jak i tych na receptę), które zawierają 50 mg w jednej tabletce.**Działanie**Dafurag max jest lekiem przeciwbakteryjnym, zawierającym substancję czynną – furazydynę, zwaną także furaginą, która jest pochodną nitrofuranu. Furagina hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.Dafurag max zawiera maksymalną dawkę furazydyny, aż 100 mg w jednej tabletce.**Sposób użycia**Dorośli i młodzież powyżej 15 roku życiaPierwszy dzień leczenia: 1 tabletka 4 razy na dobę; następne dni leczenia: 1 tabletka 3 razy na dobę.Lek stosuje się przez 7-8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.**Ważne**Kiedy nie przyjmować leku Dafurag maxjeśli pacjent ma uczulenie na furaginę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie) 6 lub na pochodne nitrofuranu;w pierwszych trzech miesiącach ciąży;w okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistościhemolitycznej u noworodka (niedokrwistość związana z rozpadem krwinek czerwonych);u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia;jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz);jeśli pacjent ma rozpoznaną polineuropatię, np. cukrzycową (uszkodzenie nerwów spowodowanepodwyższonym stężeniem cukru we krwi);jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – lek może spowodować rozpadczerwonych krwinek (hemolizę), co z kolei może być przyczyną rozwoju niedokrwistościhemolitycznej (anemia spowodowana nadmiernym rozpadem krwinek czerwonych).Stosowanie u dzieci i młodzieżyLeku Dafurag max nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia.Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dafurag maxZ uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki, u pacjentów z zaburzeniem czynności nerekmogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, nudności, niedokrwistość. Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie zwrócić się lekarza.Pominięcie przyjęcia leku Dafurag maxNie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.**Skład**Substancją czynną leku jest furagina.1 tabletka zawiera 100 mg furaginy.Pozostałe składniki to: mannitol; laktoza jednowodna; talk; krzemionka koloidalna bezwodna; karboksymetyloskrobia sodowa (typ A); stearynian magnezu.