

3 x DOPPELSIL 25 mg 4 tabletki do rozgryzania i żucia DATA WAŻNOŚCI 30.07.2024



Cena: 16,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,025 g
Opakowanie	4 tabl.
Postać	tabl.do rozgryz.i żucia
Producent	DOPPELHERZ PHARMA GMBH
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Sildenafilum

Opis produktu

Opis

Zeszło Ci powietrze?

Weź lek na erekcję od Doppelherz i jedź dalej

Kłopoty z erekcją dotyczą aż 3 mln mężczyzn w Polsce.1

Ciebie też?

Mamy na to sposób - DoppelSil!

Sprawdzony sposób na poprawę erekcji

Dla kogo jest DoppelSil lek na erekcję?

Dla mężczyzn powyżej 18 roku życia z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji członka wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Dlaczego wybrać DoppelSil lek na erekcję?

DoppelSil od znanej i zaufanej marki Doppelherz

Działa nawet po 12 minutach (wymaga stymulacji seksualnej)

Działa do 5 godzin od zażycia tabletki

1 tabletki DoppelSil zawiera 25 mg sildenafilu pomagającego erekcję

Dyskretna forma tabletki do rozgryzania i żucia

Dostępny bez recepty

Jak działa DoppelSil lek na erekcję?

Tabletka DoppelSil zawiera 25 mg syldenafilu – substancji, która w naturalnych warunkach, tzn. w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, przywraca zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.²

W celu skutecznego działania leku DoppelSil niezbędna jest stymulacja seksualna. Wówczas możliwe jest odbycie satysfakcjonującego stosunku płciowego.

Czy DoppelSil lek na erekcję jest dla Ciebie?

SPRAWDŹ WYPEŁNIAJĄC NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNE POBIERZ ULOTKĘ PDF

Postaw na DoppelSil!

DoppelSil (Sildenafilum), 25mg, tabletki do rozgryzania i żucia.

Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg cytrynianu syldenafilu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 2,15 mg aspartamu (E 951), 70,4575 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy DoppelSil jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego DoppelSil niezbędna jest stymulacja seksualna.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu

na przemiany metaboliczne, w których biorą udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne działanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiegokolwiek postaci. Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę guanylową, takich jak riociguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawowego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy DoppelSil jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przeżytym udarze lub zawale serca oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

Podmiot odpowiedzialny: Doppelherz Pharma GmbH, Schleswiger Strasse 74, 24941 Flensburg, Niemcy.

Źródła:

1. Raport VEDI CLINIC Klinika dla Mężczyzn, Zaburzenia erekcji w Polsce, Raport został przygotowany na podstawie danych uzyskanych w grupie 351 pacjentów w wieku od 18 do 80 lat poddanych kompleksowej diagnostyce w Klinice dla Mężczyzn VEDI CLINIC w latach 2011 – 2015 oraz I kw. 2016. Dostęp internetowy: <https://klinikadlamezczyzn.pl/wp-content/uploads/2016/04/RAPORT-ZABURZENIA-EREKCJI-W-POLSCE.pdf>, (19.03.2021 r.).
2. Charakterystyka produktu leczniczego DoppelSil.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

WskazaniaDOPPELSIL 25 mg 4 tabletki do rozgryzania i żucia Tabletki do rozgryzania i żucia DoppelSil to lek przeznaczony dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji. Produkt leczniczy zawiera syldenafil, czyli substancję ułatwiającą napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Dzięki postaci w jakiej występuje, tabletki nie trzeba popijać, wystarczy ją żuć i połknąć.**Działanie**Działanie DoppelSilu związane jest z rozkurczającym działaniem syldenafilu na naczynia krwionośne prącia. Substancja czynna leku hamuje enzym fosfodiesterazę typu 5 i ułatwia napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. DoppelSil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Lek podaje się doustnie, tabletkę należy żuć w całości a następnie połknąć. Zwykle stosowane dawkowanie DoppelSilu to 1 tabletkę na ok. 30 do 60 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Maksymalna dawka dobową leku to 1 tabletkę.DoppelSil umożliwia osiągnięcie erekcji tylko po pobudzeniu seksualnym. Czas po jakim występuje działanie leku jest indywidualne dla każdego pacjenta, zwykle jest to od pół do 1 godziny po zastosowaniu. Na szybkość osiągnięcia efektu terapeutycznego leku może wpływać posiłek. Spożycie obfitego posiłku może opóźnić działanie.**Ważne**PrzeciwwskazaniaNie stosować DoppelSilu u pacjentów z uczuleniem na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania leku są ciężkie choroby serca lub wątroby, niskie ciśnienie tętnicze krwi oraz niedawno przeżyty udar czy zawał serca. Nie

podawać leku u osób z dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa), oraz u których stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. **Skład** Substancją czynną leku jest syldenafil. 1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu). Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny, stężony (do ustalenia pH).