

## EFEKTAN MAX roztwór doustny 50 mg/5ml 5 saszetek



Cena: 13,75 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	50 mg/5ml
Opakowanie	5 sasz.
Postać	roztw.doust.
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Dimenhydrinatum

### Opis produktu

**Opis**Lek Efektan Max zawiera jako substancję czynną dimenhydraminę (dimenhydrinat), działającą przeciwwymiotnie, przeciwuczuleniowo i łagodnie uspokajająco. **Sposób użycia**Lek Efektan Max należy stosować doustnie. Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej 30 minut przed planowaną podróżą lub zastosowaniem źle tolerowanego leku. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat: Zalecana dawka to 50 mg do 100 mg (1-2 saszetki). W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobową nie powinna przekroczyć 400 mg (nie więcej niż 8 saszetek na dobę). Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: Zalecana dawka to od 25 do 50 mg (maksymalnie 1 saszetka leku Efektan Max 50 mg/5 mL). W przypadku dawki 25 mg należy podać lek o mniejszej mocy Efektan, 25 mg/5 mL. W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobową u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę (nie więcej niż 3 saszetki na dobę). Ze względu na wielkość dawki (moc), lek Efektan Max, 50 mg /5 mL, nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. **Sposób podawania**Zawartość jednej saszetki bezpośrednio spożyć. **Skład**Substancja czynna: Dimenhydrinatum **Skład**Substancją czynną leku jest dimenhydramina. Pozostałe składniki to sacharoza, sacharyna sodowa (E 954), glikol propylenowy, aromat czarnej porzeczki (glikol propylenowy, kwas mlekowy, 4-(4-hydroksyfenylo)-2-butanon, kwas masłowy, damaskon beta, furaneol), woda oczyszczona.