

FOXILL żel 1 mg/g tuba 50 g

Cena: 22,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	1 mg/g
Opakowanie	1 tub. po 50 g
Postać	żel
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Dimetindenum

Opis produktu

Opis

Lek przeciwhistaminowy
Foxill® żel do stosowania w podrażnieniu skóry

Dimetinden maleas, 50 g

Foxill® to lek przeciwhistaminowy, który:

Zmniejsza świąd i obrzęk

Łagodzi podrażnienia skóry

Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające

Wskazania do stosowania

Świąd towarzyszący:

ukąszeniom owadów

oparzeniom słonecznym

choroby skóry (dermatozom)

pokrzywce

powierzchnowym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia)

Lek dostępny w **innej wersji opakowania**

Foxill® żel 30 g

Foxill. Skład i postać: 1 g żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu (Dimetindeni maleas). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek i glikol propylenowy. Bezbarwny, jednorodny żel. **Wskazania:** Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. ChPL: 2016.10.27.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” S.A. ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

FOX/031/04-2023

Wskazania Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia). **Działanie** Foxill ma postać żelu do stosowania na skórę. Foxill zawiera substancję czynną dimetyndenumaleinian, który hamuje działanie histaminy - substancji odpowiedzialnej za reakcje alergiczne. Lek działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świąducholestatycznego), zmniejsza obrzęki, łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości przeciwalergiczne. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek przeznaczony do stosowania na skórę. Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry. **Stosowanie u dzieci** Należy unikać stosowania u niemowląt i małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat) na duże obszary skóry. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Foxill? Jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenumaleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia. **Skład** Substancją czynną leku jest dimetyndenumaleinian. 1 gram żelu zawiera 1 mg dimetyndenumaleinianu. Pozostałe składniki to: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikolpropylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.