

## FURAGINUM MAX US Pharmacia 100 mg 30 tabletek



Cena: 24,90 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	100 mg
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Furazidinum



### Opis produktu

**Wskazania**Lek uroFuraginum Max stosuje się w przypadku zakażeń dolnych dróg moczowych.Furazydyna hamuje rozwój wielu bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.**Działanie**UroFuraginum Max to lek w postaci tabletek doustnych, do stosowania na zakażenia dróg moczowych.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tabletkę można podzielić na równe dawki, podawać doustnie podczas posiłków. Popijać dużą ilością płynów, stosować jednocześnie dietę bogatą w białka.Zalecana dawka (dorośli i młodzież powyżej 15. roku życia): Pierwszy dzień stosowania: 400 mg na dobę w 4 dawkach podzielonych (1 tabletkę co 6 godzin); następne dni leczenia: 300 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych (1 tabletkę co 8 godzin).Lek stosuje się zwykle 7-8 dni. Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, należy zwrócić się do lekarza.**Ważne**Przeciwwskazania:Nie należy stosować leku uroFuraginum Max: jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę lub pochodne nitrofuranu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli u pacjenta występuje polineuropatia obwodowa np. cukrzycowa (zespół uszkodzenia nerwów obwodowych, mogący charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi lub zaburzeniami układu nerwowego o innym charakterze), jeśli pacjent ma niedobór enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącego udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach), gdyż lek może wtedy wywoływać hemolizę (uszkodzenie krwinek i niedokrwistość),jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz), a w badaniach laboratoryjnych stwierdzono klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy.**Skład**Substancją czynną leku jest furazydyna (Furazidinum), zwana także furagliną.1 tabletkę zawiera 100 mg furazydyny.Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokryształiczna krzemowana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typu A.

Galeria



**Furaginum MAX**  
 US Pharmacia

**Maksymalna dawka w 1 tabletkę!<sup>1</sup>**

**LECZY**  
 ostre i przewlekłe zakażenia dolnych dróg moczowych

**HAMUJE**  
 namnożenie bakterii w drogach moczowych

**ZWALCZA**  
 źródło problemu<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dawka 100 mg Furaginum MAX  
<sup>2</sup> Dawka Furaginum MAX jest skuteczna również w zakażeniach skóry. DPH, Furaginum Max

**Furaginum MAX**  
 US Pharmacia

**Najczęstsze objawy**

Tętno: podwyższone

Nagłe parcie na mocz

Ciepłota

Ból i bolesne oddziaływanie moczu

**Furaginum MAX**  
 US Pharmacia

**Stosuj terapię do końca!**

Ustąpienie objawów nie zawsze świadczy o całkowitym wyleczeniu infekcji.

**Niedoleczenie infekcji może być przyczyną jej nawrotu!<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> WSKŁĘKANIA, Amox. Rozmieszczenie infekcji: gramy i bakterie. Prawdopodobnie: Furaginum MAX, 100 mg, 30 szt.

**Furaginum MAX**  
 US Pharmacia

**Zwiększ skuteczność leczenia**

- Przyjmaj lek podczas posiłków zawierających białko (tj. mięso, ryby, nabiał), które zwiększa wchłanianie furaginy
- Spożywaj dodatkową ilość płynu co przyspiesza usuwanie bakterii z dróg moczowych<sup>1</sup>

<sup>1</sup> WSKŁĘKANIA, Amox. Rozmieszczenie infekcji: gramy i bakterie. Prawdopodobnie: Furaginum MAX, 100 mg, 30 szt.

**Furaginum MAX**  
 US Pharmacia

**Dawkowanie**

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat:

Pierwszy dzień leczenia:  
**1 tabletkę 4 razy na dobę**

Następne dni leczenia:  
**1 tabletkę 3 razy na dobę**