

HIRUDOID żel 0,3 g/100g 40 g DELFARMA

Cena: 19,50 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|---------------------|
| Dawka | 300 mg/100g |
| Opakowanie | 40 g (tub.) |
| Postać | żel |
| Producent | DELFARMA SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Heparinoidum |

Opis produktu

WskazaniaDo stosowania miejscowego na skórę w przypadku: tępych urazów z krwiakami lub bez krwiałków, zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.**Działanie**Hirudoid® dzięki zawartości polisialczanu mukopolisacharydowego zapobiega tworzeniu się zakrzepów powierzchownych, stymuluje ich wchłanianie, wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe oraz przyspiesza wchłanianie krwiałków i obrzęków. Przyczynia się do regeneracji struktur tkankowych.**Sposób użycia**Nakładać 1-3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści/żelu. Hirudoid® w postaci maści/żelu należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo.**Ważne**Do określenia częstości występowania działań niepożądanych przyjęto następującą klasyfikację: bardzo często ($\geq 1/10$), często ($\geq 1/100$ do $< 1/10$), niezbyt często ($\geq 1/1\ 000$ do $< 1/100$), rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $< 1/1\ 000$), bardzo rzadko ($< 1/10\ 000$), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).Zaburzenia skóry i tkanki podskórnejBardzo rzadko:miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj przemijają szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego. Zaburzenia układu immunologicznego 4- hydroksybenzoesan metylu i propylu może powodować reakcje alergiczne.**Skład**HIRUDOID® żel 40 g 0,3/100mg (Mucopolisaccharidum polisulphatum)