INALDIN GARDŁO 1,5 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 ml

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1,5 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aer.do stos.w j.ust.
Producent	BAUSCH HEALTH IRELAND LTD.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Benzydaminum

Opis produktu

Opis

Poznaj Inaldin Gardło

Dla kogo Inaldin Gardło?

Jak stosować Inaldin Gardło?

Szczegóły produktu Inaldin Gardło

Poznaj

Inaldin Gardło jest stosowany w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Dla kogo ?

Inaldin Gardło to aerozol do stosowania w jamie ustnej na ból gardła dla dzieci i dorosłych.

działa znieczulająco

zwalcza ból

leczy stan zapalny

Jak stosować ?

Nie częściej niż co 1,5-3 godz. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 4 dawki.

Nie częściej niż co 1,5-3 godz.

Nie częściej niż co 1,5-3 godz. Osoby w podeszłym wieku: brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Leczenie nie powinno przekraczać 7 dni.

Pozostałe produkty

Inaldin Gardło tabletki

Na ból gardła dla osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej

INALDIN Gardło, 3 mg, tabletki do ssania. Skład: każda tabletka zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminy. Postać farmaceutyczna: tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: INALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Inaldin Gardło MAX aerozol

Na ostry ból gardła dla osób dorosłych

INALDIN Gardło MAX, 3 mg/ml. Skład: Jedna dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 510 mcg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum). Postać farmaceutyczna: aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła lub podrażnień błony śluzowej jamy ustnej lub gardła. INALDIN Gardło MAX jest wskazany do stosowania u osób dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, D24PPT3, Irlandia.

Szczegóły produktu

Skład

Stosowanie

Opakowanie

Inne informacje

INALDIN Gardło, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór. Skład: jeden mililitr aerozolu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku. Każda dawka aerozolu (0,17 ml) zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku.

Postać: aerozol Wielkość opakowania: 30 ml, 1,5 mg/ml Ilość dawek: 150 Okres ważności: 3 lata Okres ważności po pierwszym użyciu: 160 dni

Chl-PL-2211-029

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA. NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ DAWKI LEKU. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

WskazaniaINALDIN GARDŁO 1,5 mg/ml aerozol do stosowania w jamie ustnej 30 ml Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.**Działanie**INALDIN Gardło jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. Działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz znieczulająco na błonę śluzową jamy ustnej, przynosząc szybką ulgę.**Sposób użycia**Dawkowanie - jak stosować INALDIN Gardło:DawkowanieDorośli i dzieci w wieku powyżej 12 latod 4 do 8 dawek aerozolu (zawierają od 1,02 do 2,04 miligramów benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada od 0,91 do 1,82 miligramów benzydaminy) od 2 do 6 razy na dobę; nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat4 dawki aerozolu (zawierają 1,02 miligramów benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada 0,91 miligramów benzydaminy) od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny.Dzieci w wieku poniżej 6 lat1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała (zawiera 0,26 miligramów benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada 0,23 miligramów benzydaminy na 4 kg masy ciała) od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5 – 3 godziny. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 4 dawki (zawierają 1,02 miligramów benzydaminy chlorowodorku, co odpowiada 0,91 miligramów benzydaminy).Osoby w podeszłym wiekuBrak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania. Nie ma konieczności zmiany dawkowania.Leczenie nie może przekraczać 7 dni.Sposób podawaniaPodanie dogardłowe.Ustawić końcówkę dozownika w pozycji poziomej. Jeśli produkt stosuje się po raz pierwszy, trzymając butelkę w pozycji pionowej, należy mocno nacisnąć dozownik kciukiem bądź palcem wskazującym. Czynność należy powtórzyć 5 razy w celu uzyskania prawidłowego rozpylania. Jeśli lek stosuje się po raz kolejny, dozownik należy nacisnąć 2 razy. Następnie należy skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej i nacisnąć dozownik.**Ważne**Należy unikać kontaktu produktu z oczami.U niewielu pacjentów może wystąpić owrzodzenie policzków lub gardła spowodowane przez ciężką chorobę. Dlatego pacjenci, u których objawy nasilą się lub nie ustąpią w ciągu 3 dni, lub u których wystąpi gorączka lub inne objawy, muszą zasięgnąć odpowiedniej porady lekarza lub dentysty.Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać reakcje alergiczne. Jeśli to nastąpi, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej terapii.Nie zaleca się stosowania benzydaminy w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi w wywiadzie, ponieważ u tych osób może wystąpić skurcz oskrzeli.Ten produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218) (patrz punkt 2), który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).Ten produkt leczniczy zawiera 81,40 mg alkoholu (etanolu) w każdym mililitrze co odpowiada 13,84 mg / 0,17 ml (jedna dawka). Zawartość etanolu w jednej dawce (0,17 ml) tego produktu jest równoważna mniej niż 0,4 ml piwa lub 0,2 ml wina. Niewielka ilość alkoholu w tym produkcie nie spowoduje żadnych zauważalnych skutków.Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej dawce (0,17 ml), to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.**To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą**Skład**ICN Polfa Rzeszów S.A.Ul. Przemysłowa 235 – 959 RzeszówPrzedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:Bausch Health Poland sp. z o.o.Ul. Przemysłowa 235 – 959 Rzeszów

Galeria

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.