

MIOVELIA NAC 15 kapsułek

Cena: 46,82 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	15 kaps.
Postać	kaps.
Producent	NUTROPHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis MIOVELIA NAC 15 kapsułek Miovelia NAC to specjalistyczny preparat stosowany w celu stymulacji owulacji dla kobiet starających się zająć w ciążę. Produkt rekomendowany jest kobietom z zespołem policystycznych jajników (PCOS), będącym najczęstszym zaburzeniem endokrynologicznym wśród kobiet w wieku rozrodczym. 1 W składzie Miovelia NAC znajduje się N-acetyl L-cysteina (NAC), która wpływa na stymulację owulacji, zwiększając tym samym szanse na zapłodnienie. 2 To składnik o wielokierunkowym działaniu: zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, zmniejsza stężenie insuliny we krwi, redukuje poziom androgenów, wpływa na proces uwalniania insuliny w odpowiedzi na glukozę, posiada właściwości antyoksydacyjne i mukolityczne, wywiera wpływ na integralność naczyń. 3, 4 Preparat Miovelia NAC zalecany jest kobietom z zaburzeniami płodności, które mogą być wynikiem m. in. złego odżywiania się lub stresu oksydacyjnego. NAC to związek stymulujący owulację u kobiet z PCOS, również tych z insulinoopornością. Dawkowanie preparatu MIOVELIA NAC przez 5 kolejnych dni zaczynając od 3 dnia cyklu miesięczkowego jest oparte na badaniach z zastosowaniem NAC w dawce 1200 mg u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS). 5-8 W badaniach wykazano, że stosowanie NAC u kobiet z PCOS wpływa na stymulację owulacji, jak również zwiększony odsetek ciąży. 2 Nie powoduje przy tym hiperstymulacji jajników. 9 Preparat można stosować także w trakcie terapii cytrynianem klomifenu, wykorzystywanym w leczeniu niepłodności u kobiet spowodowanej brakiem owulacji. 6, 7 Preparat powinien być stosowany pod nadzorem lekarza. Produkt Miovelia NAC spełnia najwyższe standardy jakości, czego potwierdzeniem jest widoczny na opakowaniu hologram NQS. Świadczy on o wysokim bezpieczeństwie stosowania oraz wykorzystaniu substancji aktywnych o potwierdzonej naukowo skuteczności. Piśmiennictwo: 1. Neven C, A, H, Teede L. J, HJ, Boyle JA. A Summary on Polycystic Ovary Syndrome : Diagnostic Criteria , Prevalence , Clinical Manifestations , and Management According to the Latest International Guidelines. Semin Reprod Med. 2018;36:5–12. 2. Thakker D et al. Obstet Gynecol Int. 2015; 2015: 8178493. Lekha Saha, et al.: N-acetyl cysteine in clomiphene citrate resistant polycystic ovary syndrome: A review of reported outcomes. J Pharmacol Pharmacother. 2013 Jul-Sep; 4(3): 187–191. 4. Fulghesu AM. et al. Fertility and Sterility. 2015; 77(6) 1128–355. Rizk AY: Fertil Steril. 2005 Feb;83(2):367-706. Nasr A. Reproductive BioMedicine Online. 2010; 20(3): 403–97. Badawy A. et al. Acta Obstetricia et Gynecologica. 2007; 86(2): 218-222. 8. Salehpour S., et al. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 2012;38(9):1182–11869. Teimouri B. et al. Int J Women's Health Reprod Sci 2021; 9(1): 75-79. **Sposób użycia** Spożywać zgodnie z zalecanym przez lekarza schematem lub jeżeli lekarz nie zaleci inaczej 3 kapsułki na dobę od 3 dnia cyklu przez 5 dni. Stosować pod nadzorem lekarza. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, spożywać 3 kapsułki na dobę od 3. dnia cyklu, przez 5 kolejnych dni. Przyjmować wraz z posiłkiem. Popi

wodą. Przed przyjmowaniem preparatu umyć ręce.

WażneWażna informacja: Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza. Dieta niekompletna pod względem odżywczym. Produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny stosować preparatu. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować, jeśli występuje choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, ostry stan astmatyczny lub zmniejszona zdolność odrzucania wydzieliny. Nie stosować u dzieci do 14. roku życia. **Przechowywanie:** Przechowywać w temperaturze pokojowej (od 15 do 25°C), w suchym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Produkt nie wymaga przechowywania w lodówce. **Skład** Składniki 3 kapsułki: 100 g zawiera: **Wartość energetyczna** (kJ/kcal) 8,28/1,98467,09/111,21 **Tłuszcz** (g), w tym: 0,031,77 **kwasów tłuszczowych nasyconych** (g) 0,031,63 **Węglowodany** (g) w tym: 0,158,83 **Cukry** (g) 0,000,04 **Białko** (g) 0,2714,98 **Sól** (g) (z czego sól w mg) 0,00 (0 mg) 0,04 (16 mg) **N-acetyl L-cysteina** (mg) 120067 680 **Składniki:** N-acetyl L-cysteina, substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka); mączka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: kwasy tłuszczowe, dwutlenek krzemu. **Procent (%) energii z:** Tłuszczu 14, Węglowodanów 32, Białka 54. Produkt wyprodukowany bez użycia pszenicy i soli. **Producent** NUTROPHARMA Sp. z o. o. ul. Jedności 10A05-506 Lesznowola

Galeria

