

MUFLUIL HIPERTONIC hipertoniczny roztwór do zakraplania i nebulizacji 10 ampułek po 5 ml

Cena: 35,95 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 amp. po 5 ml
Postać	roztw.do neb.
Producent	SOLINEA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

WłaściwościRozrzedza gęsty i lepki śluz dzięki fizycznemu i mechanicznemu działaniu jego składników. Roztwór do zakraplania i nebulizacji z N-acetylocysteiną i hipertonicznym roztworem chlorku sodu (3% NaCl).MUFLUIL HIPERTONIC wskazany jest w leczeniu chorób układu oddechowego charakteryzujących się nadmierną produkcją gęstej i lepkiej wydzieliny takich jak: ostre zapalenie oskrzeli, przewlekłe zapalenie oskrzeli i jego powikłania, rozedma płuc, mukowiscydoza, rozstrzenie oskrzeli, zapalenie zatok, wysiękowe zapalenia ucha.MUFLUIL HIPERTONIC to sterylny roztwór, który może być stosowany poprzez:nebulizację do drzewa oskrzelowego przy użyciu inhalatora;bezpośrednie wkraplanie do uszu i/lub nosa;podanie dooskrzelowe przez cewnik lub bronchoskop.**Sposób użycia**Inhalacja: nebulizować jedną ampułkę, 1-2 razy dziennie przez 5-10 dni. Częstotliwość i dawki mogą być modyfikowane przez lekarza w szerokim zakresie mając na uwadze efekt kliniczny i terapeutyczny, bez konieczności znacznego różnicowania dawek dla dorosłych i dla dzieci.Wkraplanie i płukanie uszu oraz innych jam: ½ ampułki lub 1 ampułka na aplikację.Podanie dotchawiczo-oskrzelowe: 1 ampułka na aplikację, 1-2 razy dziennie lub w zależności od potrzeb.Podczas otwierania ampułki MUFLUIL HIPERTONIC wydziela siarkowy zapach, który w żaden sposób nie wpływa na stosowanie preparatu. Roztwór może czasami zmienić kolor na różowy w otwartej ampułce lub pojemniku nebulizatora, nie wpływa to na aktywność i tolerancję preparatu.**Ważne**CE 0426To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.Ważne informacje dotyczące wyrobu medycznego:Wyrób medyczny - posiada oznakowanie CE.Posiada deklarację zgodności UEZawiera instrukcję obsługi w języku polskimZawiera etykietę w języku polskimPrzechowywanie oraz transport wyrobów medycznych są zgodne z warunkami określonymi przez producenta.**Składniki**Jedna ampułka 5 ml zawiera: 300 mg N-acetylocysteiny, 150 mg chlorku sodu. Substancje pomocnicze: wodorotlenek sodu, wersenian sodu, woda do iniekcji.Skład w momencie publikacji. Aktualne INCI znajduje się na stronie producenta i/lub opakowaniu.