

## PELAVO MED 20 mg 20 tabletek

Cena: 21,95 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	20 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.uleg.rozpad.w.j.ust.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Pelargonium sidoides

### Opis produktu

**Wskazania** Pelavo MED to produkt leczniczy stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia. Lek zawiera wyciąg z korzenia pelargonii afrykańskiej i jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych. **Działanie** Pelavo Med jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania. Tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia. Pelavo Med jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. **Sposób użycia** Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę (20 mg wyciągu) 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem). Dzieci w wieku 6 – 12 lat: 1 tabletkę (20 mg wyciągu) 2 razy na dobę (rano i wieczorem). Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest zalecane. Czas stosowania: Jeśli mimo stosowania leku Pelavo Med objawy utrzymują się dłużej niż 1 tydzień należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Sposób stosowania: stosować doustnie. Tabletkę należy umieścić na języku, poczekać aż się rozpuści i połknąć ze śliną. Tabletki można przyjmować bez popicia. **Ważne PRZECIWWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii), na inne gatunki pelargonii oraz na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA:** Nie stosować z innymi produktami linii Pelavo lub zawierającymi wyciąg z korzenia pelargonii. Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Odnotowano przypadki hepatotoksyczności i zapalenia wątroby podczas stosowania produktu leczniczego. W przypadku wystąpienia objawów hepatotoksyczności należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu leczniczego i skontaktować się z lekarzem. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy nasilą się lub utrzymują się dłużej niż 1 tydzień należy skonsultować się z lekarzem. Glukoza (pochodząca z maltodekstryny) Pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Dwutlenek siarki (E 220) Produkt leczniczy rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli. Sód Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. **Skład** Jedna tabletkę zawiera 20 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzeń pelargonii) - Pelargonii radicis extractum siccum (4-25:1); rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m). Substancje pomocnicze: Ekstrakt: maltodekstryna Tabletkę: mannitol, etyloceluloza, hypromeloza, krospowidon, sukraloza, aromat malinowy ( w tym: maltodekstryna kukurydziana (zawiera glukozę) , dwutlenek siarki); aromat mleczny ( w tym: maltodekstryna kukurydziana (zawiera glukozę), dwutlenek siarki); kwas cytrynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.