

ZYRTEC UCB 10 mg 10 tabletek, lek na alergię



Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|------------------|
| Dawka | 0,01 g |
| Opakowanie | 10 tabl. |
| Postać | tabl.powl. |
| Producent | VEDIM SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Cetirizinum |

Opis produktu

WskazaniaZYRTEC UCB 10 mg 10 tabletekZyrtec UCB to lek przeciwalergiczny, który zawiera cetyryzynę. Lek stosuje się w celu łagodzenia objawów sezonowego i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa a także pokrzywki. Zyrtec UCB można podawać dzieciom w wieku od 6 lat oraz osobom dorosłym.**Działanie**Zyrtec UCB działa przeciwalergicznie (przeciwhistaminowo).**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zyrtec UCB stosuje się doustnie, popijając szklanką płynu.Tabletkę powlekaną można podzielić na 2 równe dawki.Czas trwania leczenia zależy jak długo utrzymują się objawy. Bez konsultacji z lekarzem lek można stosować nie dłużej niż 10 dni.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletkę) raz dziennie.Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.**Ważne**PrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku Zyrtec UCB:jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),u osób uczulonych na dichlorowodorek cetyryzyny, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków) albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Działania niepożądaneJak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Często występujące działania niepożądane (1 na 10 pacjentów):senność, zawroty głowy, bóle głowy,zapalenie gardła,zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci),biegunka, nudności,suchość w jamie ustnej,zmęczenie.Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):pobudzenie,parestezja (zaburzenia czucia),ból brzucha,świąd, wysypka,astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie.Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko),depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność,drgawki,tachykardia (przyspieszone bicie serca),nieprawidłowa czynność wątroby,pokrzywka, obrzęk, zwiększenie masy ciałaBardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):trombocytopenia (mała liczba płytek krwi),tiki (skurcze nawykowe), dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (nieprawidłowe, długotrwałe skurcze mięśni), drżenie,omdlenie,zaburzenia smaku,niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych),obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka pętlek,zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu)Częstość nieznaną:zwiększony apetyt,próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem), koszmary senne,utrata pamięci, zaburzenia pamięci,zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi),zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego),świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku,ból stawów,wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną, zapalenie wątroby.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed zastosowaniem leku należy

skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent cierpi na niewydolność nerek, problemy z oddawaniem moczu, choruje na padaczkę lub występuje ryzyko pojawienia się drgawek. Zyrtec UCB zawiera laktozę, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Przechowywanie: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Stosowanie innych leków: Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Stosowanie leku z jedzeniem i piciem: Pokarm nie wpływa na wchłanianie leku Zyrtec UCB. Tak jak w przypadku innych leków o działaniu przeciwhistaminowym, zaleca się unikać przyjmowania jednocześnie Zyrtec UCB z alkoholem. Ciąża i karmienie piersią: Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Leku Zyrtec UCB nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. **Skład** Substancją czynną leku jest: cetyryzyny dichlorowodorek (Cetirizini dihydrochloridum). 1 tabletkę powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru. Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Opadry Y-1-7000 (hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400). **Producent** Podmiot odpowiedzialny: VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa Dystrybutor: MagnaPharm Poland Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa

Galeria

Zyrtec UCB
Przejmij kontrolę nad swoją alergią

- Lek przeciwalergiczny II generacji
- Kontrola objawów alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki
- Możliwość przyjmowania leku niezależnie od posiłku
- Dobra tolerancja¹
- Korzystna cena i duże opakowanie – 10 tabletek

Indygo ale!

© 2019 VEDIM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Np. 2019-05-20 10:00:00. Data wydania: 2019-05-20 10:00:00. Wszystkie prawa zastrzeżone. Np. 2019-05-20 10:00:00. Data wydania: 2019-05-20 10:00:00.

Zyrtec UCB
Przejmij kontrolę nad swoją alergią

Tabletkę powlekana Zyrtec UCB zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru. Każdą tabletkę można podzielić na 2 równe dawki.

Dawkowanie:

Dorośli: 10 mg (1 tabletkę) raz na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę (1 tabletkę).

Dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania postaci tabletek, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (poł tabletki dwa razy na dobę).

Indygo ale!

© 2019 VEDIM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Np. 2019-05-20 10:00:00. Data wydania: 2019-05-20 10:00:00.

Zyrtec UCB
Przejmij kontrolę nad swoją alergią

Zyrtec UCB, 10 mg, w postaci tabletek powlekanych jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;
- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Indygo ale!

© 2019 VEDIM Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Np. 2019-05-20 10:00:00. Data wydania: 2019-05-20 10:00:00.