

2 x DIFORTAN żel 0,1 g/g 100 g

Cena: 54,50 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/g
Opakowanie	100 g (tuba)
Postać	żel
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Etofenamatum

Opis produktu

Opis

Czy wiesz, że... Działanie Cechy produktu Dostępne warianty produktu Ulotka

CZY WIESZ, ŻE...

Najczęściej odczuwane dolegliwości, które są powiązane z wiekiem, to:

Ból uporczywy ograniczający narastający Dolegliwości mięśnie plecy stawy

STAN ZDROWIA LUDNOŚCI 2014, GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY OMNIBUS VII 2016

DZIAŁANIE

DIFORTAN LEK O DZIAŁANIU:

przeciwobrzękowym

przeciwbólowym

przeciwzapalnym

Stworzony do stosowania miejscowego z szerokim zastosowaniem w:

bólu reumatycznym bólu stawów bólu mięśni bólu pourazowym zapaleniem ścięgien naciągnięciu mięśni stłuczeniu zwichnięciu kontuzji bólu reumatycznym bólu stawów bólu mięśni bólu pourazowym zapaleniem ścięgien naciągnięciu mięśni stłuczeniu zwichnięciu kontuzji

CECHY PRODUKTU

LEK oparty na substancji **ETOFENAMAT**, stworzonej do stosowania miejscowego

Działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe i przeciwzapalne Doskonale się wchłania Silnie koncertuje się na tkance objętej stanem zapalnym¹ Lek w formie bezbarwnego i niebrudzącego hydrożelu o neutralnym zapachu.

¹ Jacobi [1979] Eur J Rheumatol Inflamm 2; 189-293.

DOSTĘPNE WARIANTY PRODUKTU:

50g

100g

ULOTKA

Dawkowanie i sposób podawania Przeciwwskazania Działania niepożądane Opakowanie

Stosować od trzech do czterech razy na dobę przez 14 dni, przy czym pojedynczą dawkę stanowi pasek żelu o długości od 2,5 do 5 cm. W przypadku dolegliwości reumatycznych, wymagających dłuższego leczenia, należy zmniejszyć liczbę dawek do dwóch lub trzech na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku urazów tkanek miękkich i (lub) dolegliwości reumatycznych, bądź 21 dni w przypadku bólów stawów, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku stosowania produktu bez recepty pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpi poprawa lub jeśli objawy ulegną pogorszeniu po 7 dniach terapii. Znaczące zmniejszenie bólu obserwowano po 3 lub 4 dniach stosowania leku Difortan. Produkt leczniczy należy delikatnie wmasować w skórę, aby ułatwić wchłanianie w dotkniętym schorzeniem obszarze.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Często: świąd, rumień, miejscowe podrażnienie. Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, fotodermatoza. Bardzo rzadko: pokrzywka, reakcje pęcherzowe (w tym zespół Stevensa-Johnsona), toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka. Nie należy stosować na błony śluzowe i oczy. Nadwrażliwość ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowej z innymi lekami przeciwzapalnymi.

- 50 mg/g,- 100 mg/g, żel

Dawkowanie i sposób podawania

Stosować od trzech do czterech razy na dobę przez 14 dni, przy czym pojedynczą dawkę stanowi pasek żelu o długości od 2,5 do 5 cm.

W przypadku dolegliwości reumatycznych, wymagających dłuższego leczenia, należy zmniejszyć liczbę dawek do dwóch lub trzech na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 14 dni w przypadku urazów tkanek miękkich i (lub) dolegliwości reumatycznych, bądź 21 dni w przypadku bólów stawów, chyba że lekarz zaleci inaczej. W przypadku stosowania produktu bez recepty pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli nie nastąpi poprawa lub jeśli objawy ulegną pogorszeniu po 7 dniach terapii. Znaczące zmniejszenie bólu obserwowano po 3 lub 4 dniach stosowania leku Difortan. Produkt leczniczy należy delikatnie wmasować w skórę, aby ułatwić wchłanianie w dotkniętym schorzeniem obszarze.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciąża; dzieci; miejsca, w których występuje wyprysk, otwarte rany, wrzody lub urazy.

Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Często: świąd, rumień, miejscowe podrażnienie. Rzadko: kontaktowe zapalenie skóry, alergiczne zapalenie skóry, fotodermatoza. Bardzo rzadko: pokrzywka, reakcje pęcherzowe (w tym zespół Stevensa-Johnsona), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Nie należy stosować na błony śluzowe i oczy. Nadwrażliwość ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji krzyżowej z innymi lekami przeciwzapalnymi.

Opakowanie

- 50 mg/g,- 100 mg/g, żel

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

USP Zdrowie Sp. z o.o.ul. Poleczki 3502-822 Warszawa, Polska