

## 2 X PANGROL 10 000 j.m. 50 kapsułek



Cena: 66,00 PLN

### Opis słownikowy

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rodzaj rejestracji Lek

### Opis produktu

#### Opis

PANGROL 10 000 uzupełnianie enzymów trzustkowych w zaburzeniach trawienia wynikających z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.

#### Wskazania

przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od jego przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym, zwapnienia tropikalnego, samoistnego),

związania przewodu trzustkowego, spowodowanego np., przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe,

zaburzeń wątroby i dróg żółciowych, całkowitej lub częściowej resekcji trzustki i wycięcia trzustki i dwunastnicy,

przyspieszonego pasażu jelitowego na skutek resekcji żołądka i jelita cienkiego, stresu lub chorób zapalnych jelit,

spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów i pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony oraz wynikające z tego zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych i niestrawność,

choroby trzewnej,

choroby zapalnej jelit (zwłaszcza choroby Crohna),

cukrzycy, zespołu nabytego braku odporności (AIDS),

zespołu Shwachmana,

zespołu Sjögrena.

Produkt leczniczy można stosować u osób dorosłych (w tym także osób w podeszłym wieku) i dzieci.

#### Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na wieprzowinę lub inny składnik produktu leczniczego,

ostre zapalenie trzustki i ostre napady w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby,

#### Dawkowanie

Zależy od stopnia niedoboru enzymów trzustkowych, jak również od dostępności biologicznej leku. Może być konieczne przyjmowanie większych dawek. Zwiększenie dawkowania wymaga uprzedniej konsultacji z lekarzem. Nie należy przekraczać dobowej dawki 15 000 - 20 000 jednostek lipazy na kilogram masy ciała. O ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek leku Pangrol 10 000 na każdy posiłek. Kapsułki leku Pangrol 10 000 należy połykać w całości w trakcie posiłku popijając dużą ilością wody. Pacjenci, którzy nie są w stanie połknąć kapsułki, mogą wysypać jej zawartość do odpowiedniej ilości płynu i natychmiast zażyć bez rozgryzania lub żucia.

#### Skład:

lipazy 10 000 j. Ph. Eur.,

amylazy 9 000 j. Ph. Eur.,

proteaz 500 j. Ph. Eur.