


2XCLATRA ALLERGY 20 mg 10 tabletek

Cena: 19,60 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,02 g
Opakowanie	10 tabl.
Postać	tabl.
Producent	MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Bilastinum

Opis produktu

WskazaniaLek Clatra Allergy zawiera substancję czynną bilastynę, która działa przeciwhistaminowo.**Działanie**Lek Clatra Allergy stosuje się w celu złagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, świąd, katar, zatknięty nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek może być również stosowany do leczenia swędzących wysypek skórnych (pokrzywka).Clatra Allergy jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawka u dorosłych, w tym osób w podeszłym wieku, oraz młodzieży w wieku 12 lat i powyżej to 1 tabletkę (20 mg) na dobę.Tabletkę do podawania doustnego.Tabletkę należy przyjmować jedną godzinę przed lub dwie godziny po jakimkolwiek posiłku lub wypiciu soku owocowego (patrz punkt 2, „Lek Clatra Allergy z jedzeniem, pić i alkoholem”).Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.Linia podziału na tabletkę służy jedynie do ułatwienia przełamania tabletki, jeśli pacjent ma trudności z połknięciem jej w całości.Czas trwania leczenia zależy od rodzaju choroby i jest określany przez lekarza.**Ważne**Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.**Skład**Co zawiera lek Clatra AllergySubstancją czynną jest bilastyna. Każda tabletkę zawiera 20 mg bilastyny.