

3 x DULCOSOFT JUNIOR roztwór doustny 100 ml



Cena: 45,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	100 ml
Postać	roztwór doustny
Producent	Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

Opis

łagodne wsparciena dziecięce zaparcie

Naturalne uczucie ulgi

Współpracuje z organizmem, przynosząc przyjemną ulgę w zaparciach.1

Nie zmienia smaku napoju¹

Neutralny smak - po prostu dodaj DulcoSoft do 150 ml Twojego ulubionego napoju, najlepiej rano.¹

Praktycznie niewchłaniany przez organizm¹

Wywiera swoje działanie w sposób czysto fizyczny: nie jest wchłaniany przez organizm oraz ulega wydaleniu wraz z kałem w postaci niezmienionej.¹

Daje przewidywalny efekt¹

Nie powoduje nagłego działania przeczyszczającego. Praktycznie nie daje uczucia nagłego parcia.¹

Czy wiesz, że nawet co 3. dziecko cierpi z powodu zaparcí?⁷

Objawy, jakie mogą towarzyszyć zaparciu u dziecka to:

ból brzucha,

wzdęcia,

unikanie toalety,

czy uczucie niepełnego wypróżnienia.⁸

Zaparcie u dziecka może powstać z przyczyn takich jak: gorączka, odwodnienie, błędy dietetyczne czy stres (zarówno w przedszkolu jak i w domu).^{9,10}

Naturalne uczucieulgi

Zawiera Makrogol 4000

Makrogol wykazuje wysoką zdolność do wiązania wody i opóźnia wchłanianie wody w jelitach, przez co ułatwia wypróżnienie.¹

Poprawia komfort wypróżnień¹

Dobrze tolerowany w leczeniu czynnościowych i przewlekłych zaparć u dzieci i dorosłych.³ Dodatkowo reguluje wypróżnienia do 1 na dobę.²

Łagodne działanie

Łagodnie i skutecznie przeciwdziała zaparciom i nieregularności wypróżnień.¹ Zaczyna działać nawet po 24 godzinach.¹

Przeznaczenie

Produkt dla całej rodziny. Odpowiedni dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia i dla kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.¹

dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej **8 lat**

20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10 20 g makrogolu 4000)

Dzieci **4-7 lat**

16-32 ml roztworu na dobę (co odpowiada 8 16 g makrogolu 4000)

Dzieci **2-3 lat**

16 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 8 g makrogolu 4000)

Dzieci powyżej **6. miesiąca do roku życia**

8 ml roztworu na dobę (co odpowiada 4 g makrogolu 4000)

Najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Produkt można zmieszać z wybranym napojem, np. ze szklanką wody, soku owocowego lub herbaty (około 150 ml).¹

skład

Dulcosoft Junior 100 ml

10 ml roztworu zawiera 5 mg makrogolu 4000¹

Rodzina produktów Dulco

Typ Produktu
Właściwości
Składnik
Opakowanie

duże opakowanie

Dulcobis
TabletkiLek bez recepty
Przynosi ulgę w zaparciach już po 6h4

Dulcobis
TabletkiLek bez recepty

Dulcobis
CzopkiLek bez recepty
Szybka ulga
w zaparciach już po 10
minutach5
Bisakodyl
10 czopków
Sprawdź

Bisakodyl
20 tabletek
Sprawdź

Bisakodyl
60 tabletek
Sprawdź

Dulcosoft
Roztwór doustnyWyrób medyczny
Działa w ciągu 24-72 godzin6

Makrogol 4000
250 ml
Sprawdź

Dulcosoft Junior
Roztwór doustnyWyrób medyczny
Produkt w formie roztworu, który ułatwia wypróżnienia i przynosi
łagodną ulgę w zaparciach1
Makrogol 4000
100 ml
Sprawdź

Dulcosoft Junior SIP 03/2023. Badania kliniczne z makrogolem 4000 potwierdzają, że w przypadku regularnego przyjmowania wypróżnienia zazwyczaj występują raz na dobę; instrukcja używania, DulcoSoft proszek do sporządzania roztworu doustnego 03.2023, DulcoSoft Junior roztwór doustny 03.2023, DulcoSoft roztwór doustny 03.2023. Lyseng-Williamson K. A. Macrogol (polyethylene glycol) 4000 without electrolytes in the symptomatic treatment of chronic constipation: a profile of its use. *Drugs & Therapy Perspectives*, 2018; 34:300-310. Dulcobis tabletki 5 mg ChPL 04.2022 działania przeczyszczające następuje między 6 a 12 godziną od podania. Dulcobis, 10 mg, czopki ChPL 04/2022.; Dulcobis 5 mg tabletki ChPL, 04/2022. Działanie przeczyszczające czopków występuje średnio po 20 minutach od podania (10-45 minut) i jest szybsze od działania bisakodylu w formie tabletek dojelitowych (6-12 h). Instrukcja używania DulcoSoft roztwór 03.2023. Van den Berg MM et al. Epidemiology of childhood constipation: a systematic review. *AM J Gastroenterol*. 2006; 101(10):2401-9. Czerwionka-Szaflarska M., Romańczuk B. Postępowanie w zaparciu czynnościowym stolca u dzieci i młodzieży. *Forum Medycyny Rodzinnej* 2008, 2(5): 349-357. Albrecht P. Zaparcia u dzieci. Cięża i dziecko. 2019; 1. <https://opieka-farmaceutyczna.eu/artukul/zaparcia-u-dzieci> dostęp: 01.08.2019. Gibas-Dorna M, Piątek J. Functional constipation in children – evaluation and management. *Prz Gastroenterol*. 2014;9(4):194-9. Werth, B.L. Epidemiology of constipation in adults: Why estimates of prevalence differ. *J. Epidemiol. Res.* 2019, 5, 37–49. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al.. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition; North American Society for Pediatric Gastroenterology. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2014;58(2):258-74.

DulcoSoft@Junior, roztwór doustny, makrogol 4000. Zastosowanie: objawowe leczenie ostrych i przewlekłych zaparć, zmiękczenie twardych mas kałowych. Producent: Hälsa Pharma GmbH. Dystrybutor: Opella Healthcare Poland Sp. z o. o.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

MAT-PL-2301731-2.0-07.2023

Właściwości Twoje dziecko ma zaparcia? Wydaje się nic wielkiego, jednak każdy rodzic wie, że trudności z wypróżnieniem się mogą wiązać się z płaczem czy zawstydzeniem u dziecka. Powodów zaparć może być wiele. Czasem jest to samonakręcająca się spirala – maluch raz doświadczy bolesnego wypróżnienia, więc boi się kolejnego i celowo wstrzymuje się z pójściem do toalety. Narastający problem ma niebagatelny wpływ nie tylko na zdrowie jelita, ale i na samopoczucie dziecka. Odpowiedzią może być DULCOSOFT Junior® w formie roztworu do rozpuszczenia w ulubionym napoju malucha. Preparat poprawia komfort wypróżnień i reguluje pracę jelit. Nie jest wchłaniany przez organizm, jest wydalany wraz z kałem w niezmienionej postaci. Dodatkowo jest łatwy do podania i nie zmienia smaku ulubionego napoju.
WSKAZANIA Objawowe leczenie zaparć Na przewlekłe zaparcia Zmiękczenie twardych mas kałowych
DZIAŁANIE Zdolność do wiązania wody Zmiękczenie mas kałowych Łagodne pobudzenie perystaltyki jelit Ułatwia wypróżnianie Działa w 24-72 h Łagodnie i skutecznie przeciwdziała zaparciom i nieregularności wypróżnień
WŁAŚCIWOŚCI Wygodna do podania forma płynu Przywraca naturalny rytm wypróżnień Nie wchłania się Odpowiedni do stosowania w przewlekłych zaparciach Neutralny smak - nie zmienia smaku napoju Odpowiedni dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia Odpowiedni dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią Nie zawiera cukru Nie zawiera glutenu Nie zawiera laktozy Odpowiedni dla pacjentów stosujących dietę niskosodową
Sposób użycia Dzieci powyżej 6. miesiąca życia . do 1 r.ż.: 8 ml roztworu na dobę, najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Dzieci od 2 do 3 lat: 8-16 ml roztworu na dobę, najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Dzieci od 4 do 7 lat: 16-32 ml roztworu na dobę, najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Dorośli i dzieci powyżej 8 lat: 20-40 ml roztworu na dobę, najlepiej w pojedynczej dawce przyjmowanej rano. Produkt można mieszać z wybranym napojem, np. ze szklanką wody, soku owocowego lub herbaty (około 150 ml).
Ważne PRZECIWSKAZANIA
• Nie stosować produktu DULCOSOFT Junior® w następujących przypadkach:
• Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
• Ciężka zapalna choroba jelit (taka jak wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozdęcie okrężnicy.
• Wystąpienie lub ryzyko wystąpienia

perforacji przewodopokarmowego. • Porażenna niedrożność jelit bądź też podejrzenie niedrożności jelit lub objawowego zwężenia jelit. • Brzuszne zespoły bólowe o nieokreślonej przyczynie. Nie stosować produktu DULCOSOFT Junior® jeśli występują powyższe objawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości przed przyjęciem wyrobu medycznego DULCOSOFT Junior® należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. **Składniki** 10 ml płynu DULCOSOFT Junior® zawiera 5 g makrogolu 4000. Pozostałe składniki: sorbinian potasu, makrogol 400, kwas cytrynowy, woda oczyszczona. **Producent** Sanofi Aventisul. Bonifraterska 1700-203 Warszawa. **Dystrybutor:** Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Galeria

