

## 4 FLEX PureGel żel 0,1 g/g 100 g

Cena: 15,90 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,1 g/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Naproxenum

### Opis produktu

#### Opis

Redukuje ból. Leczy stawy.

Lek na ból i stan zapalny mięśni i stawów.

Poznaj lek 4Flex PureGel Udowodniona skuteczność Profil bezpieczeństwa Dla kogo lek 4Flex PureGel? Szczegóły produktu

Poznaj lek 4Flex PureGel

Nowy 4Flex PureGel – LEK W POSTACI BEZBARWNEGO ŻELU

Naprosen dobrze przenika do mazi stawowej i na długo pozostaje w tkankach stawu. Precyzyjnie działa w miejscu objętym stanem zapalnym i bólem.

Działanie leku 4Flex PureGel:

**przeciwzapalne**

**przeciwbólowe**

**łagodzące obrzęk zapalny**

Wskazania - leczenie miejscowe:

bóli mięśniowo-stawowych

choroby zwyrodnieniowej stawów

Udowodniona skuteczność

SKUTECZNY W PRZEWLEKŁYCH CHOROBYCH STAWÓW

REDUKUJE BÓL I ZMNIJSZA SZTYWNOŚĆ STAWÓW

LEK 4FLEX PUREGEL - NAPROKSEN1

WCHŁANIANIE

bardzo dobrze się wchłania dzięki dodatkowi etanolu; samo nałożenie żelu wywołuje natychmiastowy efekt chłodzący i znieczulający

PRZENIKANIE

szybko penetruje do stawu

KONCENTRACJA W MIEJSCU DOCELOWYM

osiąga w mazi stawowej wysokie stężenia

DŁUGOTRWAŁA DEPOZYCJA W STAWIE

długi okres półtrwania, który wynosi 14-28 godzin (wzrasta z wiekiem) • ibuprofen, ketoprofen i diklofenak – dużo krótszy okres półtrwania 1-3 h

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA<sup>2,3</sup>

American College of Rheumatology (2019) rekomenduje miejscowe leczenie przeciwzapalne:

w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego (silna rekomendacja)

w chorobie zwyrodnieniowej stawów dłoni

Metaanaliza 53 randomizowanych badań klinicznych wykazała, że w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego (28 dni terapii) naproksen był najskuteczniejszą opcją farmakologiczną w zakresie zmniejszania bólu i poprawy funkcji stawu

Profil bezpieczeństwa

#### PROFIL BEZPIECZEŃSTWA

Naproksen z najniższym wśród NLPZ ryzykiem sercowo-naczyniowym jest szczególnie zalecany u osób w podeszłym wieku

Dzięki długiemu okresowi półtrwania efekt terapeutyczny utrzymuje się dłużej

Niskie ryzyko działań niepożądanych ogólnoustrojowych, przedawkowania oraz interakcji z innymi lekami z uwagi na stosowanie miejscowe

Dla kogo?

DLA KOGO LEK 4Flex PureGel?

Osoby, które cierpią na bóle mięśni i stawów

Osoby starsze z chorobą zwyrodnieniową stawów

Osoby z przewlekłymi stanami zapalnymi stawów

Osoby uprawiające sport, które narażone są na urazy stawów

Referencje:

1.

Goodman and Gilman's The pharmacological basis of therapeutics. Chapter 34 Anti-inflammatory, antipyretic, and analgesic agents. 12th ed. New York: Pergamon Press; 2011.

2.

Kolasinski SL et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Care & Research Vol. 72, No. 2, Feb 2020, 149-162.

3.

Jevsevar DS et al. Mixed Treatment Comparisons for Nonsurgical Treatment of Knee Osteoarthritis: A Network Meta-analysis. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons: May 2018, Vol 26, Issue 9, p 325-336.

Szczegóły produktu 4Flex PureGel 100g, żel przeciwbólowy i przeciwzapalny

Skład Stosowanie Opakowanie Inne informacje

4Flex PureGel jest lekiem w postaci żelu. Zawiera substancję czynną naproksen w ilości 100 mg/g, należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Żel stosuje się miejscowo, na skórę, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Skutkiem działania jest zmniejszenie bólu i obrzęku. 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum). Wykaz składników pomocniczych: Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe: • bóle mięśniowo-stawowych; • choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie 4Flex PureGel należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Maksymalna dawka dobową naproksenu wynosi 1000 mg.

Dzieci i młodzież Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży, grupę docelową należy ograniczyć do dorosłych. Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Po posmarowaniu, żel rozprowadzić w miejscu bólu i masować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Produktu leczniczego nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak: bandaże czy plastry.

Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle wynosi nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po 1 tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Nadwrażliwość na naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona) Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie stosować w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

Opakowanie Tuba aluminiowa od wewnątrz pokryta lakierem epoksydowo-fenolowym z membraną i z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku. Tuba 100 g

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności 2 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.

Postać farmaceutyczna Żel Przejrzysty, jednorodny, bezbarwny lub o barwie żółtawej/lekko żółtej żel.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca: EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów

Dystrybutor: Bausch Health Poland sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Skład

4Flex PureGel jest lekiem w postaci żelu. Zawiera substancję czynną naproksen w ilości 100 mg/g, należąca do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Żel stosuje się miejscowo, na skórę, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

Skutkiem działania jest zmniejszenie bólu i obrzęku. 1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu (Naproxenum). Wykaz składników pomocniczych: Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona.

## Stosowanie

### Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowe: • bóli mięśniowo-stawowych; • choroby zwyrodnieniowej stawów.

### Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie 4Flex PureGel należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości około 4 cm. Maksymalna dawka dobową naproksenu wynosi 1000 mg.

Dzieci i młodzież Z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu u dzieci i młodzieży, grupę docelową należy ograniczyć do dorosłych. Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Po posmarowaniu, żel rozprowadzić w miejscu bólu i masować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu produktu leczniczego należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Produktu leczniczego nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak: bandaże czy plastry.

Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle wynosi nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po 1 tygodniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania Nadwrażliwość na naproksen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (Trolamina, Etanol 96%, Karbomer, Woda oczyszczona) Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie stosować w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią.

## Opakowanie

Opakowanie Tuba aluminiowa od wewnątrz pokryta lakierem epoksydowo-fenolowym z membraną i z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku. Tuba 100 g

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności 2 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.



## Inne informacje

Postać farmaceutyczna Żel Przejrzysty, jednorodny, bezbarwny lub o barwie żółtawej/lekko żółtej żel.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca: EMO-FARM Sp. z o.o. ul. Łódzka 52 95-054 Ksawerów

Dystrybutor: Bausch Health Poland sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Val-PL-2007-021