


ACARD 75 mg 120 tabletek profilaktyka chorób serca

Cena: 27,90 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,075 g
Opakowanie	120 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum

Opis produktu

Wskazania ACARD 75 mg 120 tabletek Acard jest wskazany w profilaktyce choroby niedokrwiennej serca i wtórnego zawału, a także w zapobieganiu powikłaniom pozawałowym. Wskazaniem do stosowania jest także: niestabilna choroba wieńcowa, podejrzenie świeżego zawału serca, angioplastyka wieńcowa, niedokrwieny udar mózgu oraz zarostowa miażdżyca tętnic obwodowych. Preparat może być stosowany we wszelkich sytuacjach, w których konieczne jest hamowanie agregacji płytek krwi. **Działanie** kwas acetylosalicylowy skutecznie hamuje agregację płytek krwi – dzięki temu, iż tabletki posiadają otoczki nie rozpadają się w żołądku i zmniejszają drażniące działanie kwasu na jego błonę śluzową. **Sposób użycia** doustnie, jedna tabletkę (75mg) na dobę. Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku, połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. **Ważne** Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pochodne kwasu acetylosalicylowego, skaza krwotoczna, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ciężka niewydolność nerek i wątroby, astma aspirynowa. Lek nie może być stosowany w ostatnim trymestrze ciąży, a także u dzieci poniżej 12 roku życia z infekcjami wirusowymi. **Skład** 1 tabletkę zawiera: substancję czynną: kwas acetylosalicylowy 75mg oraz substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu dwutlenek (E171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, emulsja antypienna.