

ACC 200 mg 20 tabletek musujących

Cena: 17,90 PLN



Opis słownikowy

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

ACC MAX tabletki musujące

Wskazania

ACC MAX jest wskazany jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Działanie

ACC Max upłynnia wydzielinę i ułatwia odkrztuszanie wydzieliny z dróg oddechowych.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na acetylocysteinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy.

- Ostry stan astmatyczny.
- Zmniejszona zdolność odkrztuszania wydzieliny.
- Ciąża i okres karmienia piersią.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

- Acetylocysteinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą (ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli), u osób w podeszłym wieku lub z niewydolnością oddechową.
- Ze względu na brak doświadczeń dotyczących stosowania acetylocysteiny w okresie ciąży i karmienia piersią, preparatu nie należy stosować u kobiet w tym czasie.
- Nie dowiedziono, aby acetylocysteina zaburzała zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne

- Bez zalecenia lekarza preparatu nie należy stosować dłużej niż 4 do 5 dni.
- Preparatu ACC MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Sposób użycia

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat :

Dawka dobową acetylocysteiny wynosi od 400 mg do 600 mg w 2 lub 3 dawkach podzielonych (1 tabletkę musującą ACC MAX dwa lub trzy razy na dobę).

- Dzieci w wieku od 6 do 14 lat:

Dawka dobową acetylocysteiny wynosi 400 mg w 2 dawkach podzielonych (1 tabletkę musującą ACC MAX dwa razy na dobę). Jeżeli konieczne jest podanie 300 mg acetylocysteiny na dobę, należy zastosować lek ACC mini.

Tabletki ACC MAX należy przyjmować po posiłku. Tabletkę musującą należy rozpuścić w 1 szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Nie stosować wieczorem, przed snem. Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Skład

1 tabletkę musującą zawiera 200 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum).

Substancje pomocnicze: Jedna tabletkę musującą zawiera 82,9 mg sodu. Kwas cytrynowy bezwodny, Sodu wodorowęglan, Sodu węglan, Kwas askorbowy, Sacharyna sodowa dwuwodna, Sodu cyklamian (E952), Makrogl 8000, Aromat jeżynowy, Aromat jagodowy