

AESCIN 20 mg 30 tabletek



Cena: 16,45 PLN

Opis słownikowy

Producent TEVA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

WskazaniaAESCIN 20 mg 30 tabletekleczeniu przewlekłej niewydolności żylnnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.leczeniu zapalenia żył kończyn dolnych.profilaktyce i leczeniu krwiałków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.**Działanie**Lek Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych.Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiałków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu).Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylnolimfatyczne. Lek stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.**Sposób użycia**Lek Aescin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą ilością płynu.Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki) 2 razy na dobę.W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-escyny.Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna zmiana dawkowania.Dzieci: nie zaleca się stosowania leku u dzieci.W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.**Ważne**Kiedy nie stosować leku Aescin:jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku Aescin,jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.**Skład**Co zawiera lek AescinSubstancją czynną leku jest alfa-escyna.Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu stearynian.Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbant 80, kopolimer kwasu metakrylowego, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110).