

AFLOFARM Krople walerianowe, 35 g



Cena: 4,03 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	35g
Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Wskazania

Przejęciowe stany łagodnego napięcia nerwowego oraz przejęciowe trudności z zasypianiem.

Działanie

Uspokajające.

Sposób użycia

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią etykiety i ulotki przed zastosowaniem leku, w tym celu należy odkleić etykietę w prawym górnym rogu w miejscu oznaczonym strzałką. **Dawkowanie:** Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: w łagodnych stanach napięcia nerwowego: 45 kropli (1,5 mL) w ¼ szklanki wody 3 razy na dobę. W przejęciowych trudnościach z zasypianiem: 60 kropli (2 mL) wieczorem, 30-60 minut przed snem, z wcześniejszą dawką 45 kropli (1,5 mL) podczas kolacji, jeśli konieczne. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej etykiety i ulotce lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 tygodniach stosowania należy skontaktować się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Ten lek zawiera 1089 mg alkoholu (etanolu) w każdym 60 kroplach (2 mL), co jest równoważne 54,5% (w/v). Ilość alkoholu w 60 kroplach (2 mL) tego leku jest równoważna 28 mL piwa lub 11 mL wina. Ilość alkoholu w tym leku prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na dorosłych i młodzież. Alkohol w tym leku może zmieniać działanie innych leków. Jeśli pacjent przyjmuje inne leki, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli pacjent jest uzależniony od alkoholu, powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Krople walerianowe Aflofarm a inne leki: Nie zaleca się stosowania leku jednocześnie z innymi lekami uspokajającymi. **Ciąża i karmienie piersią:** Ze względu na brak danych

potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować leku. **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:** Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. **Przedawkowanie:** W przypadku zażycia dawki większej niż zalecana mogą wystąpić łagodne objawy (zmęczenie, skurcze brzucha, zawroty głowy, rozszerzenie źrenic, uczucie ucisku w klatce piersiowej, drżenie rąk), które mijają w ciągu 24 godzin. Jeśli objawy nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku pominięcia dawki leku kolejną należy zastosować jak najszybciej. **Działania niepożądane:** Sporadyczne przypadki nietolerancji waleriany (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha). **Zgłaszanie działań niepożądanych** Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej etykietoulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

Składniki

Nalewka z korzenia kozłka.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel. (42) 22-53-100