

## ALERIC DESLO ACTIVE 2,5 mg 10 tabletek



Cena: 11,40 PLN

### Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

### Opis produktu

#### Opis

Jak działa Aleric Deslo Active? O leku Stosowanie Skład Alergia i jej objawy Szczegóły produktu

Jak działa Aleric Deslo Active?

Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

Łagodzi kichanie i świąd

Zmniejsza uczucie zatkanego nosa

Łagodzi zaczerwienienie i łzawienie oczu

Wskazany w leczeniu pokrzywki

O leku

Aleric Deslo Active 2,5 mg to lek przeciwhistaminowy III generacji\*\*. Zawiera desloratadynę – nowoczesną substancję przeciwhistaminową.

Wskazany jest dla dorosłych i dzieci 6+.

Lek w postaci niewielkiej tabletki o przyjemnym smaku, która rozpada się w jamie ustnej.

Substancja czynna nie przedostaje się do ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu lek zmniejsza ryzyko wystąpienia uciążliwych skutków ubocznych związanych z sedacją, takich jak: senność, brak koncentracji czy utrudnienia w prowadzeniu pojazdów.

Zwalcza dolegliwości związane z alergią

Nie wymaga popijania – nowoczesna forma tabletki rozpadającej się w ustach

Nie wywołujeseności

Stosowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

Wystarczy stosować 1 raz na 24h

1 tableta niezależnie od posiłków

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

5 ML x 1 NA DOBĘ (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) niezależnie od posiłków

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

5 ML x 1 NA DOBĘ (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) niezależnie od posiłków

Nowoczesna forma tabletki rozpadającej się w ustach. Nie wymaga popijania, jest niewielka i przyjemna w smaku.

## Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg.

Pozostałe składniki leku to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroscarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

## Sprawdź również

Portfolio ALERIC oferuje rozbudowaną ofertę leków dostępnych bez recepty, umożliwia dostosowanie intensywności terapii do rodzaju objawów i wieku Pacjenta

lek sterydowy do nosa, działający miejscowo

leki antyhistaminowe najnowszej generacji działające ogólnoustrojowo\*\* - bez komponenty sedatywnej

lek sterydowy do nosa, działający miejscowo

leki antyhistaminowe najnowszej generacji działające ogólnoustrojowo\*\*\* - bez komponenty sedatywnej

## Alergia i jej objawy

Alergia to poważny problem medyczny. Uznana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.1

W Polsce alergiczny nieżyt nosa występuje u 42% Polaków.1

Do jego przyczyn można zaliczyć pylenie roślin i roztocza kurzu domowego.2

Objawy alergicznego nieżytu nosa

Wydzielina z nosa

Kichanie

Swędzenie nosa, podniebienia i gardła

Łzawienie

Uciążliwy katar to tylko jeden z możliwych objawów. Alergie powodują również dolegliwości skórne:

wysypki, obrzęki podskórne czy świąd.

Blisko 4 miliony osób w Polsce

przynajmniej raz w życiu doświadczyło pokrzywki\*\*\*

Objawy pokrzywki:

Wysypki i obrzęki podskórne

Świąd

## Szczegóły produktu

Wskazania Ważne informacje Sposób podawania Opakowanie Kontakt

## Wskazania do stosowania

Aleric Deslo Active łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarzem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 6 lat i starszych.

Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Aleric Deslo Active stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych, codziennych czynności oraz normalnego snu.

Kiedy nie stosować leku Aleric Deslo Active:

– jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

## Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Aleric Deslo Active w czasie ciąży lub karmienia piersią.

#### Aleric Deslo Active a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

#### Stosowanie leku Aleric Deslo Active z jedzeniem, pić i alkoholem

Nie jest konieczne popijanie leku wodą lub innym płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Aleric Deslo Active z alkoholem.

#### Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

#### Opakowanie

Opakowanie zawiera 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

#### Sposób podawania

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

Zalecana dawka to dwie tabletki raz na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć, rozdzierając go.

Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połączyć dawkę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat

Zalecana dawka to jedna tabletką raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.,

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.,

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,

tel. +48 (22) 543 60 00

\* na podstawie CHPL Aleric Deslo Active 5mg

\*\* A. Lewandowska-Polak, M.L. Kowalski, Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych. Przegląd Alergologiczny 2004, t. 1, nr 2, s. 45

\*\*\* Raciborski F. iwsp. Epidemiology of Urticaria in Poland – nationally representative survey results. Postepy Dermatol Alergol 2018; 35(1): 67–73.

1 Badania U&A, Alergiczny nieżyt nosa, Ipsos, maj 2019 (Wartości podane w %; Podstawa: wszyscy, N=1001; A8. Która z poniższych dolegliwości wystąpiła u Pana/i w ciągu ostatnich 12 miesięcy; A9 Proszę zaznaczyć, jakie czynniki w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w



Pana/i przypadku przyczyną kataru alergicznego / siennego)


2 Zasady postępowania w Alergicznym Nieżyciu Nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; 2012 Prof. Dr hab. Bolesław Samoliński, Dr n. med. Monika Świerczyńska- Krępa, Dr n. med. Anna Gruda-Duda

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

## Galeria



**ALERIC**  
 DESLO ACTIVE  
 Niewielka tabletki,  
 przyjemny smak




**ALERIC**  
 DESLO ACTIVE  
 Zwalcza objawy alergii,  
 nie powoduje senności



**ALERIC**  
 DESLO ACTIVE  
 Nowoczesna terapia  
 przeciwalergiczna\*



**ALERIC**  
 DESLO ACTIVE



**ALERIC**  
 DESLO ACTIVE  
 Nowoczesna terapia  
 przeciwalergiczna\*

