

ALERIC Spray do nosa 50 mcg/dawkę 60 dawek



Cena: 23,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,05 g
Opakowanie	60 daw.
Postać	aer.do nosa
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Mometasonum

Opis produktu

Opis

Jak działa Aleric Spray? O leku Stosowanie Skład Alergia i jej objawy Szczegóły produktu

Jak działa Aleric Spray?

Zmniejsza uczucie zatkanego nosa

Zmniejsza ilość wydzieliny z nosa

Łagodzi kichanie i świąd

Łagodzi objawy stanu zapalnego

O LEKU

Aleric Spray stosowany jest w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zwanego także katarzem siennym).

Wskazany jest dla osób powyżej 18-tego roku życia.

zawiera MOMETAZON

działa miejscowo przeciwzapalnie - biodostępność

Galeria

ALERIC SPRAY

Blokuj alergię z ALERIC SPRAY

ZMNIJSZA UCZUCIE ZATKANEGO NOSA

ZMNIJSZA ILOŚĆ WYDZIELINY Z NOSA

ŁAGODZI KICHANIE I ŚWIAD

ŁAGODZI OBJAWY STANU ZAPALNEGO

ALERIC SPRAY

Blokuj alergię z ALERIC SPRAY

STOSOWANIE

Wystarczy stosować raz na dobę

1 dzień
 1 dzień

1 dzień

3 tygodnie

18+

Bez konieczności konsultacji z lekarzem

Dla osób dorosłych

ALERIC SPRAY

Blokuj alergię z ALERIC SPRAY

Lek z adrenergami do stosowania dorosłego

Składnik czynny: leku jest trimetazolinę hydrochlorid, 50 mg/ml (50 mg/ml).

Składnik pomocniczy: benzalkoniowy chlorek, metakresol, glicerol, polisorbat 80, wodorotlenek potasu, woda.

Dawkowanie i sposób podania:

Wstrząsnąć przed każdym użyciem.

Dorośli: Zwykle stosuje się dwie dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Po użyciu aerozolu należy przemyć dziurki otworów jedną dawką aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę. Dawka ta powinna być składowa w kierunku podrygającym.

Dzieci: Lek ALERIC SPRAY nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, miazmatyczny katar, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przewlekły zapalenie błony śluzowej nosa, takich jak choroba popękanej błony śluzowej nosa lub innych części dróg oddechowych, choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia, choroby układu moczowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby układu nerwowego, choroby układu endokrynnego, choroby układu immunologicznego, choroby układu hormonalnego, choroby układu genetycznego, choroby układu limfatycznego, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroby układu krążenia, choroby układu moczowego, choroby układu pokarmowego, choroby układu nerwowego, choroby układu endokrynnego, choroby układu immunologicznego, choroby układu hormonalnego, choroby układu genetycznego, choroby układu limfatycznego.

U niektórych pacjentów objawy występujące w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki ALERIC Spray, takich jak: kichanie i łezkowanie mogą nie pojawić się w ciągu dwóch dni, w tym czasie należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia.

Jeżeli po maksymalnym 14 dniach stosowania leku pacjent nie odnotowa poprawy lub odnotowa pogorszenie, należy skontaktować się z lekarzem. Maksymalny czas stosowania leku ALERIC Spray jest konsultacji z lekarzem wynosi 3 miesiące.



ALERIC SPRAY

Blokuj alergię z ALERIC SPRAY

DUŻE OPAKOWANIE