

ALLERTEC WZF 10 mg 20 tabletek

Cena: 13,50 PLN



Opis słownikowy

Dawka	10 mg
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Cetirizinum

Opis produktu

Opis

1.0 brak_do_dodania 04_04_2023

MARKA NR 1
wśród leków

bez recepty
NA ALERGIĘ*

Lek przeciwalergiczny

20 tabletek, 10 mg Cetirizini dihydrochloridum

Nareszcie jest duże opakowanie leku na alergię!

Aż 20 tabletek na 20 dni walki z objawami alergii i oszczędzasz 20%**

Allertec WZF wskazany jest:

w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu,

związanych w sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, swędzenie oczu);

w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki

(długotrwałe utrzymujące się silne swędzące bąble na skórze).

Dawkowanie:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat

5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

10 mg (1 tabletkę powlekana) raz na dobę

Lek dostępny w innej wersji opakowania

7 powlekanych tabletek

10 powlekanych tabletek

* Dotyczy sprzedaży ilościowej dla Allertec WZF, Allertec Fexo, Allertec Wapno Plus oraz Allertec Effect. Based on internal analysis by Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. using data from following source: IQVIA Poland Pharmascope for the period 10/2022; OTC3: 01E1 RESPIR&GENER ANTIALLERG, MAT 11/22, Units. reflecting estimates of real world activity. Copyright IQVIA. All rights reserved.

** Cena za tabletkę w porównaniu do Allertec WZF x 10 tabl. Cena z cennika hurtowego.

Allertec Effect WZF. Skład i postać: Tabletki powlekane barwy białej do kremowej, podłużne, obustronnie wypukłe z rowkiem dzielącym. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Każda tabletkę powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichloroworku (Cetirizini dihydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sól. Jedna tabletkę powlekana zawiera 31 mg laktozy jednowodnej. Wskazania: U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 10674 wydane przez MZ. Lek wydawany bez recepty. ChPL: 2022.10.28.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01 207 Warszawa

ALL WZF/117/02 2023

Wskazania Allertec WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej. **Działanie** w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkały nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu); w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwałe utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze). **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Tabletkę można podzielić na równe dawki. Zwykle stosowane dawki leku podano poniżej. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat 10 mg (1 tabletkę powlekaną) raz na dobę. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla dzieci i dorosłych, w zależności od stopnia zaburzeń czynności nerek, wieku oraz masy ciała pacjenta. Zwykle stosowane dawki leku u dorosłych podano poniżej: • łagodne zaburzenia czynności nerek - 10 mg (1 tabletkę powlekaną) raz na dobę. • umiarkowane zaburzenia czynności nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę. • ciężkie zaburzenia czynności nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień. Nie stosować leku w przypadku ciężkiej niewydolności nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. Pacjenci w podeszłym wieku Jeżeli czynność nerek jest prawidłowa, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. W przypadku wrażenia, że działanie leku Allertec WZF jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Czas trwania leczenia **Ważne** Kiedy nie stosować leku Allertec WZF Jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzynę, dichlorowodorek, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min). **Skład** Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletkę powlekaną zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.