

ALTABACTIN maść 5 g

Cena: 9,25 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Dawka | (250j.m.+5mg)/g |
| Opakowanie | 5 g |
| Postać | maść |
| Producent | SANDOZ GMBH |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Bacitracinum, Neomycinum |

Opis produktu

WskazaniaALTABACTIN maść 5 gAltabactin to lek o działaniu przeciwbakteryjnym w postaci maści do stosowania miejscowego na skórę. Altabactin wskazany jest podczas leczenia zakażenia niewielkich powierzchni skóry np. małych ran. Lek stosuje się u osób dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.**Działanie**Altabactin w swoim składzie zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym - bacytracynę i neomycynę, które dzięki skojarzonej reakcji mają szeroki zakres działania. Bacytracyna działa przede wszystkim na bakterie Gram-dodatnie, a neomycyna także na Gram-ujemne. Altabactin nie działa na grzyby i wirusy.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek do stosowania miejscowego. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: od 2 do 3 razy na dobę nakładać cienką warstwę na chorobowo zmienione miejsce. Nie należy stosować więcej niż 1 g neomycyny na dobę (co odpowiada 200 g leku Altabactin). W razie potrzeby można przykryć opatrunkiem. Nie stosować dłużej niż 7 dni, jeśli po tym czasie nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.**Ważne**PrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku Altabactin: jeśli pacjent jest uczulony na bacytracynę, neomycynę, inne antybiotyki aminoglikozydowe lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, na duże powierzchnie skóry, w ciężkich uszkodzeniach skóry oraz długotrwale, ze względu na ryzyko toksycznego działania leku na nerki i słuch, z utratą słuchu włącznie, jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub nerek, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej uszkodzenie narządu słuchu (przedsionka lub ślimaka), jeśli pacjent ma przedziurawioną błonę bębenkową (perforacja), nie należy stosować maści do ucha zewnętrznego, do oczu i na błony śluzowe, na rany głębokie lub klute, sączące zmiany chorobowe, ciężkie oparzenia, duże powierzchnie uszkodzonej skóry.**Skład**Substancjami czynnymi są: bacytracyna i neomycyna (Bacitracinum, Neomycinum). 1 g maści zawiera 250 IU bacytracyny i 5 mg neomycyny. Substancje pomocnicze: lanolina i parafina ciekła.