

APAP dla dzieci FORTE 40mg/ml zawiesina 150 ml



Cena: 17,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,04 g/ml
Opakowanie	150 ml
Postać	zaw.doust.
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Opis

Na każdą gorączkę od urodzenia 1 U dzieci poniżej 3 miesięcy życia tylko po zaleceniu lekarza

na jakie dolegliwości? dlaczego apap dla dzieci forte jak stosować apap dla dzieci forte skład szczegóły produktu

Na jakie dolegliwości?

gorączka

ból głowy

ból gardła

ból lub/i gorączkaw przebiegu grypy lub przeziębienia

ból związany z zapaleniem ucha środkowego

ból zęba

bolesne ząbkowanie

bóle mięśni i kości

ból lub/i gorączka związanez odczynem poszczepiennym

gorączka w przebiegu ospywietrznej lub biegunki wirusowej

Dlaczego APAP dla dzieci Forte?

Apap dla dzieci Forte zawiera paracetamol, substancjęo działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

Mało leku do podaniadzięki stężeniu 40 mg/ml

Stosowanie od urodzenia¹

Pomarańczowy smak,który smakuje dzieciom²

Umożliwia dawkowanie zgodnez aktualną masą ciała dziecka

Można stosować na czczo

¹ U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza

Jak stosować APAP dla dzieci Forte?

Trzy proste kroki

Określ dawkę wyszukującaktualną wagę dzieckaw kalkulatorze dawkowania lekuApap dla Dzieci Forte.

Dobrze wstrząśnij butelkąprzed użyciem. Za pomocąstrzykawkio odmierzdopowiednią ilość leku.

Podaj lek dziecku (wartopodawać strzykawką skierowaną w stronę ścianki policzka – nie na wprost).

Kalkulator dawkowania

Dawkę leku dobieraj zawsze według masy ciała dziecka.

Dawkowanie co 6 godzin. Dawka dobowo paracetamolu 60 mg/kg masy ciała dziecka.Dawką jednorazowo 15 mg/kg masy ciała

dziecka.

Masa ciała kg

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jednorazowadawka leku w ml

1,125

1,5

1,875

2,25

2,625

3

3,375

3,75

4,125

Masa ciała kg

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Jednorazowa dawka leku w ml

4,5

4,875

5,25

6,625

6

6,375

6,75

7,125

7,5

Można stosować na czczo

Apap dla dzieci Forte jest lekiem gotowym i może być przyjmowany wraz z jedzeniem i napojami. Spożywanie jedzenia nie wykazało wpływu na skuteczność leku, **jednak przyjmowanie tego leku po posiłku może opóźnić występowanie efektów jego działania.**

Nie wolno stosować leku dłużej niż 2 dni. Jeżeli w tym czasie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci od urodzenia¹

¹ U dzieci poniżej 3 miesięcy życia tylko po zaleceniu lekarza

Pamiętaj!

Wpisz datę pierwszego otwarcia zawiesiny i korzystaj z niej przez 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia

Skład

BEZ GLUTENU

BEZ BARWNIKÓW

Substancją czynną jest paracetamol 40 mg/ml. Pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

Wybierz APAP odpowiedni do potrzeb dziecka

Na każdą gorączkę od urodzenia¹ Mało leku do połknięcia, smakuje dzieciom²

Apap dla dzieci FORTE 40 mg/ml zawiesina 85 ml

SPRAWDŹ

Na gorączkę dla dzieci od 4 roku życia Granulki na język bez popijania

Apap Junior 250 mg x 10 sasz

SPRAWDŹ

Na objawy przeziębienia i grypy od 6 roku życia: udrożnia nos i zatoki, usuwa gorączkę i ból

Apap przeziębienie junior x 6 saszetek

SPRAWDŹ

Skrócona informacja o leku po kliknięciu w „sprawdź”

Szczegóły produktu

Skład

Wskazania

Dawkowanie

Przeciwwskazania

Inne informacje

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksyben-zoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

APAP dla dzieci FORTE zawiera paracetamol. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym stosowanym do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki.

APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego żąbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych).

APAP dla dzieci FORTE jest przeznaczony do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u dzieci o masie ciała do 40 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 12 lat), dzieci powyżej 12 lat, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku).

Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Zalecana dawka dobową paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu przez lekarza. Dokładna ilość leku APAP dla dzieci FORTE powinna być podana przy użyciu 5 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) lub 6 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania.

Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkakrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą).

W przypadku wysokiej gorączki (>39°C), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć dawkę leku APAP dla dzieci FORTE o zwykłej porze.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w części składu produktu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak: obrzęk Quinckiego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności czy spadek ciśnienia krwi.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie butelki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności 3 lata. Zawiesina doustna powinna zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Podmiot odpowiedzialny US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza. 2 Leki na gorączkę i ból dla dzieci – postrzeżenie marek, N=864, 77% matek dzieci w wieku 0-10 zgadza się, że stwierdzenie „APAP dla dzieci FORTE smakuje dziecku” pasuje do marki, Q1-Q4 2019, IQS CHPL APAP dla dzieci FORTE

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Wskazania APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki (wysokiej temperatury) lub/i bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego żąbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych). APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i/lub gorączki u dzieci o masie ciała do 40 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 12 lat), młodzieży oraz u dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu lekarza. Jeśli po 2 dniach stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem. **Działanie** APAP dla dzieci FORTE zawiera paracetamol. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym stosowanym do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Zalecana dawka dobową paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4

godziny. Instrukcja dla przykładowego dawkowania 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin: Masa ciała (orientacyjny wiek w miesiącach lub latach) Jednorazowa dawka paracetamolu (co 6 godzin) Objętość jednorazowej dawki leku APAP dla dzieci FORTE (co 6 godzin) Dawka dobową mg paracetamolu Objętość leku APAP dla dzieci FORTE 3 kg (0 miesięcy) 45 mg, 1,25 ml 180 mg, 4,5 ml 4 kg (1 miesiąc) 60 mg, 1,5 ml 240 mg, 6 ml 5 kg (2 miesiące) 75 mg, 1,875 ml 300 mg, 7,5 ml 6 kg (3 miesiące) 90 mg, 2,25 ml 360 mg, 9 ml 7 kg (4-5 miesięcy) 105 mg, 2,625 ml 420 mg, 10,5 ml 8-10 kg (6-12 miesięcy) 120-150 mg, 3-3,75 ml 480-600 mg, 12-15 ml 11-15 kg (2-3 lata) 165-225 mg, 4,125-5,625 ml 660-900 mg, 16,5-22,5 ml 16-22 kg (4-6 lat) 240-330 mg, 6-8,25 ml 960-1320 mg, 24-33 ml 23-30 kg (6-9 lat) 345-450 mg, 8,625-11,25 ml 1380-1800 mg, 34,5-45 ml 31-40 kg (9-12 lat) 465-600 mg, 11,625-15 ml 1860-2400 mg, 46,5-60 ml więcej niż 41 kg 615-1000 mg, 15,375-25 ml 2460-3000 mg (więcej niż 41 do 50 kg mc.) 61,5-75 ml 4000 mg (więcej niż 51 kg mc.) 100 ml 6 ml (pełna doustna strzykawka) zawiesiny doustnej = 240 mg paracetamolu Przy powyższym schemacie dawkowania odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami musi wynosić minimum 6 godzin. Instrukcja dla przykładowego dawkowania 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny: Masa ciała (orientacyjny wiek w miesiącach lub latach) Jednorazowa dawka paracetamolu (co 4 godziny) Objętość jednorazowej dawki leku APAP dla dzieci FORTE (co 4 godziny) Dawka dobową mg paracetamolu Objętość leku APAP dla dzieci FORTE 3 kg (0 miesięcy) 30 mg, 0,75 ml 180 mg, 4,5 ml 4 kg (1 miesiąc) 40 mg, 1,0 ml 240 mg, 6 ml 5 kg (2 miesiące) 50 mg, 1,25 ml 300 mg, 7,5 ml 6 kg (3 miesiące) 60 mg, 1,5 ml 360 mg, 9 ml 7 kg (4-5 miesięcy) 70 mg, 1,75 ml 420 mg, 10,5 ml 8-10 kg (6-12 miesięcy) 80-100 mg, 2-2,5 ml 480-600 mg, 12-15 ml 11-15 kg (2-3 lata) 110-150 mg, 2,75-3,75 ml 660-900 mg, 16,5-22,5 ml 16-22 kg (4-6 lat) 160-220 mg, 4-5,5 ml 960-1320 mg, 24-33 ml 23-30 kg (6-9 lat) 230-300 mg, 5,75-7,5 ml 1380-1800 mg, 34,5-45 ml 31-40 kg (9-12 lat) 310-400 mg, 7,75-10 ml 1860-2400 mg, 46,5-60 ml więcej niż 41 kg 410-1000 mg, 10,25-25 ml 2460-3000 mg (więcej niż 41 do 50 kg mc.) 61,5-75 ml 4000 mg (więcej niż 51 kg mc.) 100 ml 6 ml (pełna doustna strzykawka) zawiesiny doustnej = 240 mg paracetamolu Przy powyższym schemacie dawkowania odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami musi wynosić minimum 4 godzin. U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu przez lekarza. Dokładna ilość leku APAP dla dzieci FORTE powinna być podana przy użyciu 6 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania. Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkakrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą). W przypadku wysokiej gorączki (>39°C), objawów wtórnego zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby lub pacjentów z zespołem Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna) skuteczna dawka dobową nie powinna przekraczać 60 mg/kg masy ciała/dobę (do dawki maksymalnej 2 g/dobę). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka musi zostać zmniejszona lub należy wydłużyć przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami leku APAP dla dzieci FORTE muszą wynosić co najmniej 8 godzin. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę. U niemowląt o masie ciała mniejszej niż 7 kg (6 miesiąc życia) powinno się rozważyć podawanie czopków, jeśli są dostępne i podawanie tej postaci farmaceutycznej nie jest niemożliwe ze względów klinicznych (np. biegunka). U dzieci o masie ciała większej niż 41 kg, młodzieży i dorosłych mogą zostać rozważone, jako bardziej właściwe inne postaci farmaceutyczne paracetamolu. Droga i sposób podania: - APAP dla dzieci FORTE przeznaczony jest do stosowania doustnego; - Dobrze wstrząsnąć przed użyciem; - Nakrętka butelki jest zabezpieczona przed otwarciem przez dziecko. Aby otworzyć, naciśnij nakrętkę i jednocześnie przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; - Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami; - Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Należy pamiętać, że większe dawki niż zalecone mogą powodować ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku APAP dla dzieci FORTE Należy natychmiast poradzić się lekarza w przypadku przedawkowania leku, nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ występuje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. Należy zabrać ze sobą butelkę lub puste opakowanie w celu ułatwienia identyfikacji leku. Aby uniknąć możliwego uszkodzenia wątroby, ważne jest podanie przez lekarza odtrutki, tak szybko jak to jest możliwe. Objawy uszkodzenia wątroby zazwyczaj nie ujawniają się wcześniej niż po kilku dniach. Objawy przedawkowania mogą obejmować nudności, wymioty, jadłowstręt (utrata apetytu), błądź i ból brzucha, a objawy te zwykle występują w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku. **Ważne** Pomińcie dawki leku APAP dla dzieci FORTE Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjmując dawkę leku APAP dla dzieci FORTE o zwykłej porze. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Skład** Co zawiera lek APAP dla dzieci FORTE Substancją czynną leku jest paracetamol. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoosan (E 218), propylu parahydroksybenzoosan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320). Jak wygląda lek APAP dla dzieci FORTE i co zawiera opakowanie APAP dla dzieci FORTE jest białym do prawie białego płynem o jednorodnym wyglądzie i pomarańczowym smaku. Butelka z bursztynowego szkła (typu III) z plastikową białą zakrętką (PP) zabezpieczającą przed dostępem dzieci i zamieszczoną instrukcją otwierania z pierścieniem (PP) i łącznikiem (LDPE) do strzykawki doustnej w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 85 ml lub 150 ml zawiesiny doustnej. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna z LDPE/PS o pojemności 6 ml.

Galeria

Na różne dziecięce dolegliwości

- gorączka
- ból głowy
- ból gardła
- ból lub/i gorączka w przebiegu grypy lub przeziębienia
- ból związany z zapaleniem ucha środkowego
- ból zęba
- bolesne zębokucie
- bole mięśni i kości
- ból lub/i gorączka związane z odległym powracającym
- gorączka w przebiegu odry, szkarlatyny lub boreliki wirusowej

APAP[®] dla dzieci FORTE

Stosowanie od urodzenia¹

Pomarańczowy smół, który smakuje dzieciom²

Bez glutenu

Bez barwników

¹ W dawkach podanych w instrukcji. ² Wskazanie do stosowania od urodzenia. ³ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ⁴ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ⁵ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ⁶ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ⁷ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ⁸ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ⁹ Wskazanie do stosowania od urodzenia. ¹⁰ Wskazanie do stosowania od urodzenia.

APAP[®] dla dzieci FORTE

Na każdą gorączkę od urodzenia¹

APAP[®] dla dzieci FORTE

Mała ilość do podania (40 mg/ml)

Dawkowanie co 6h

10-ml

Można stosować na czczo

Pamiętaj!

Wpisz datę pierwszego otwarcia zawiesziny i korzystaj z niej przez 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia

APAP[®] dla dzieci FORTE

150 ml