

APAP dla dzieci FORTE 40mg/ml zawiesina 85 ml



Cena: 20,75 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

Na każdą gorączkę od urodzenia 1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza

na jakie dolegliwości? dlaczego apap dla dzieci forte jak stosować apap dla dzieci forte skład szczegóły produktu

Na jakie dolegliwości?

gorączka

ból głowy

ból gardła

ból lub/i gorączkaw przebiegu grypy lub przeziębienia

ból związany z zapaleniem ucha środkowego

ból zęba

bolesne ząbkowanie

bóle mięśni i kości

ból lub/i gorączka związanez odczynem poszczepiennym

gorączka w przebiegu ospywietrznej lub biegunki wirusowej

Dlaczego APAP dla dzieci Forte?

Apap dla dzieci Forte zawiera paracetamol, substancjęo działaniu przeciwgorączkowym i przeciwbólowym.

Mało leku do podaniadzięki stężeniu 40 mg/ml

Stosowanie od urodzenia¹

Pomarańczowy smak,który smakuje dzieciom²

Umożliwia dawkowanie zgodnez aktualną masą ciała dziecka

Można stosować na czczo

¹ U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza

Jak stosować APAP dla dzieci Forte?

Trzy proste kroki

Określ dawkę wyszukującaktualną wagę dzieckaw kalkulatorze dawkowania lekuApap dla Dzieci Forte.

Dobrze wstrząśnij butelkąprzed użyciem. Za pomocąstrzykawki odmierzodpowiednią ilość leku.

Podaj lek dziecku (wartopodawać strzykawką skierowaną w stronę ścianki policzka – nie na wprost).

Kalkulator dawkowania

Dawkę leku dobieraj zawsze według masy ciała dziecka.

Dawkowanie co 6 godzin. Dawka dobową paracetamolu 60 mg/kg masy ciała dziecka. Dawka jednorazowa 15 mg/kg masy ciała dziecka.

Masa ciała kg

- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

Jednorazowa dawka leku w ml

- 1,125
- 1,5
- 1,875
- 2,25
- 2,625
- 3
- 3,375
- 3,75
- 4,125

Masa ciała kg

- 12
- 13
- 14

15
16
17
18
19
20

Jednorazowa dawka leku w ml

4,5
4,875
5,25
6,625
6
6,375
6,75
7,125
7,5

Można stosować na czczo

Apap dla dzieci Forte jest lekiem gotowym i może być przyjmowany wraz z jedzeniem i napojami. Spożywanie jedzenia nie wykazało wpływu na skuteczność leku, **jednak przyjmowanie tego leku po posiłku może opóźnić występowanie efektów jego działania.**

Nie wolno stosować leku dłużej niż 2 dni. Jeżeli w tym czasie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci od urodzenia¹

1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza

Pamiętaj!

Wpisz datę pierwszego otwarcia zawiesiny i korzystaj z niej przez 6 miesięcy od daty pierwszego otwarcia

Skład

BEZ GLUTENU

BEZ BARWNIKÓW

Substancją czynną jest paracetamol 40 mg/ml. Pozostałe składniki: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoatan (E 218), propylu parahydroksybenzoatan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

Wybierz APAP odpowiedni do potrzeb dziecka

Na gorączkę dla dzieci od 4 roku życia Granulki na język bez popijania

Apap Junior 250 mg x 10 sasz

SPRAWDŹ

Na objawy przeziębienia i grypy od 6 roku życia: udrożnia nos i zatoki, usuwa gorączkę i ból

Apap przeziębienie junior x 6 saszetek

SPRAWDŹ

Skrócona informacja o leku po kliknięciu w „sprawdź” 1 U dzieci poniżej 3 miesiąca życia tylko po zaleceniu lekarza. 2 Leki na gorączkę i ból dla dzieci – postrzeganie marek, N=864, 77% matek dzieci w wieku 0-10 zgadza się, że stwierdzenie „APAP dla dzieci FORTE smakuje dziecku” pasuje do marki, Q1-Q4 2019, IQS CHPL APAP dla dzieci FORTE

Szczegóły produktu

Skład

Wskazania

Dawkowanie

Przeciwwskazania

Inne informacje

Substancją czynną leku jest paracetamol.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy [aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320)].

APAP dla dzieci FORTE zawiera paracetamol. Paracetamol jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym stosowanym do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki.

APAP dla dzieci FORTE to lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu lub/i gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu lub/i gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych).

APAP dla dzieci FORTE jest przeznaczony do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u dzieci o masie ciała do 40 kg (w przybliżeniu od 0 miesięcy do 12 lat), dzieci powyżej 12 lat, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w podeszłym wieku).

Dawkowanie należy ustalić przede wszystkim na podstawie masy ciała pacjenta. Zalecana dawka dobową paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała/dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

U dzieci poniżej 3 miesiąca życia lek stosuje się tylko po zaleceniu przez lekarza. Dokładna ilość leku APAP dla dzieci FORTE powinna być podana przy użyciu 5 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) lub 6 ml doustnej strzykawki (z podziałką co 0,25 ml) dołączonej do opakowania.

Doustną strzykawkę po użyciu powinno się kilkakrotnie opłukać aż po jej wylot (wypełniając ją wodą).

W przypadku wysokiej gorączki (>39°C), objawów zakażenia lub przedłużających się objawów trwających dłużej niż 2 dni, należy

skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz przyjąć dawkę leku APAP dla dzieci FORTE o zwykłej porze.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w części składu produktu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu celem ochrony przed światłem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia reakcji alergicznych (uczulenia) na paracetamol takich jak: obrzęk Quinckiego (obrzęk twarzy, karku i narządów płciowych), duszność (skrócenie oddechu), zlewne poty (nasilone pocenie), nudności czy spadek ciśnienia krwi.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na etykiecie butelki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności 3 lata. Zawiesina doustna powinna zostać wykorzystana w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia butelki.

Podmiot odpowiedzialny US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Wskazania ból o małym i umiarkowanym nasileniu gorączka **Działanie** APAP dla dzieci FORTE to lek należący do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych, które działają przeciwbólowo w przypadku bólu o małym i umiarkowanym nasileniu oraz zmniejszają gorączkę. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Instrukcja stosowania:

APAP dla dzieci FORTE przeznaczony jest do stosowania doustnego;

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem; Nakrętka butelki jest zabezpieczona przed otwarciem przez dziecko. Aby otworzyć, naciśnij nakrętkę i jednocześnie przekręć zgodnie ze wskazówkami zegara; Zawiesina doustna nie powinna być rozcieńczana czy mieszana z innymi napojami; **Ważne** Nie należy przekraczać zalecanej dawki. **Skład** Substancją czynną leku jest paracetamol. Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), guma ksantan, woda oczyszczona, aromat pomarańczowy aromaty naturalne, aromaty sztuczne, etanol, butylohydroksyanizol (E 320).

Galeria



APAP dla dzieci FORTE

