

## ARNICA MONTANA 2,5 mg 40 tabletek podjęzykowych

Cena: 14,29 PLN



### Opis słownikowy

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Dawka              | 2,5 mg                          |
| Opakowanie         | 40 tabl.                        |
| Postać             | tabl.podjęz.                    |
| Producent          | BOIRON S.A.                     |
| Rodzaj rejestracji | Lek                             |
| Substancja czynna  | Homeopathic medicinalis product |

### Opis produktu

**Wskazania** Homeopatyczny produkt leczniczy bez wskazań leczniczych. Stosować zgodnie z zaleceniem lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. **Sposób stosowania:** Stosować podjęzykowo. Tabletki pozostawić pod językiem, aż do całkowitego rozpuszczenia. Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, w przypadku podawania leku dzieciom w wieku poniżej 4 lat, zaleca się rozpuszczenie tabletki w niewielkiej ilości wody. **Zwykłe stosowane dawkowanie:** Dorośli: 2 tabletki 3 razy na dobę. Dzieci powyżej 18. miesiąca życia: 1 tabletki 3 razy na dobę. **Czas trwania leczenia:** Zwiększyć odstępy między dawkami, w miarę uzyskania poprawy. W momencie ustąpienia objawów należy zaprzestać przyjmowania leku. Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 7 dni. **Ważne** Kiedy nie stosować Arnica montana Boiron. Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 18. miesiąca życia. Arnica montana Boiron a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. **Stosowanie leku Arnica montana Boiron z jedzeniem i pić** Lek najlepiej przyjmować między posiłkami. **Ciąża i karmienie piersią** Ten lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią i nie ma wpływu na płodność. **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn** Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Arnica montana Boiron zawiera laktozę i kroskarmelozę sodu. Lek zawiera 246,25 mg laktozy w każdej tabletkie. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. **Skład** Co zawiera Arnica montana Boiron • Substancja czynna: Arnica montana 9CH 2,5 mg w 1 tabletkie. • Pozostałe składniki to: laktoza, kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu.