

AROMATOL płyn 250 ml



**AROMATYCZNY LEK
NA WIELE DOLEGLIWOŚCI**

PL 1214401/10/2020/08

Cena: 26,90 PLN

Opis słownikowy

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

Aromatyczny lek na wiele dolegliwości

Lek Aromatol zawiera bogatą kompozycję olejków eterycznych

lewomentol

wykazuje działanie **znieczulające, odkażające, przeciwzapalne** oraz **rozkurczowe**

olejek cytrynowy

korzystnie wpływa na górne drogi oddechowe, podany na skórę działa **przeciwzapalnie i odkażająco**

olejek lawendowy

wdychany może wywołać **łagodny efekt uspokajający**, stosowany również w chorobach zakaźnych jamy ustnej, gardła, górnych dróg oddechowych i płuc^{5,6}

olejek cytronelowy

przejawia działanie **przeciwdrobnoustrojowe**⁴

olejek z mięty polnej

wykazuje **lokalne uczucie chłodu**, wykorzystywany w **infekcjach górnych dróg oddechowych** oraz **dolegliwościach bólowych**⁶

olejek goździkowy

niektóre jego składniki wykazują działanie **przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe**³

olejek z kory cynamonowca cejlońskiego

o charakterystycznym aromatyczno-korzennym zapachu; wykazuje **korzystne działanie w zapaleniach dziąseł i próchnicy zębów**²

Aromatol można stosować do **inhalacji, nacierania i płukania gardła**. Doustnie w zaburzeniach trawiennych.¹

Zewnętrznie
przeziębienie

bóle głowy

bóle mięśniowe

ukąszenia owadów

Wewnętrznie
wzdęcia

niestrawność

Aromatol to tradycyjny lek łączący pokolenia- dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.¹

do płukania gardła

ok. 5 ml (1 łyżeczka) produktu Aromatol rozcieńczyć w ok. 250 ml (szklanka) ciepłej wody. Płukać gardło i jamę ustną 1-3 razy na dobę.

doustnie

1-3 razy na dobę przyjmować 10-15 kropli zmieszanych z wodą.

do nacierań

1-3 razy na dobę nacierać skórę, aż jej powierzchnia stanie się sucha. Ukąszenia owadów: miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym mlekiem Aromatol.

do inhalacji

ok. 5 ml (1 łyżeczka) produktu Aromatol rozcieńczyć w ok. 250 ml (szklanka) gorącej wody. Wdychać powstałe opary przez kilka minut. Inhalacje powtarzać do 3 razy na dobę.

Wybierz pojemność, której potrzebujesz

Sprawdź

Szczegóły produktu

Skład Dawkowanie Opakowanie Przechowywanie Inne informacje

Skład: Co zawiera lek Aromatol?

100 g leku Aromatol zawiera: Levomentholum (lewomentol) 1,72 g, Limonis aetheroleum (olejek cytrynowy) 0,57 g, Cinnamomi zeylanici corticis aetheroleum (olejek z kory cynamonowca japońskiego) 0,24 g, Menthae arvensis aetheroleum partim mentholi privum (olejek mięty polnej, z obniżoną zawartością mentolu) 0,24 g, Lavandulae aetheroleum (olejek lawendowy) 0,24 g, Citronellae aetheroleum (olejek cytronelowy) 0,1 g, Caryophylli floris aetheroleum (olejek goździkowy) 0,1 g oraz **substancje pomocnicze:** etanol 96 % i woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: bezbarwny, klarowny płyn.

Dawkowanie: Jak stosować płyn Aromatol?

Lek można podawać doustnie, stosować do płukania gardła, zewnętrznie na skórę lub w postaci inhalacji z parą wodną.

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.

Podanie doustne W dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych) np. niestrawności, wzdęciach: 1 do 3 razy na dobę przyjmować 10 do 15 kropli leku Aromatol zmieszanych z wodą.

Podanie na skórę Do nacierań: 1 do 3 razy na dobę nacierać lekiem Aromatol, aż powierzchnia skóry stanie się sucha. W celu zmniejszenia dolegliwości po ukąszeniach owadów: miejsce po ukąszeniu przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem Aromatol.

Do płukania gardła Około 5 ml (1 łyżeczka) leku Aromatol rozcieńczyć w około 250 ml (szklanka) ciepłej wody, płukać gardło i jamę ustną 1 do 3 razy na dobę.

Stosowanie w postaci inhalacji (przy przeziębieniu) Około 5 ml (1 łyżeczka) leku Aromatol rozcieńczyć w około 250 ml (szklanka) gorącej wody i wdychać przez kilka minut powstające opary. Inhalacje powtarzać do 3 razy na dobę.

Pominięcie zastosowania leku Aromatol Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Opakowanie: Lek Aromatol dostępny jest w 3 wielkościach opakowania. Jedno opakowanie zawiera 100 ml, 150 ml lub 250 ml leku.

Przechowywanie: Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. W temperaturze poniżej 15°C może wystąpić opalizacja roztworu. Proces ten jest odwracalny w temperaturze pokojowej i nie ma wpływu na jakość produktu końcowego. Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Inne informacje: Przeciwwskazania:

Leku Aromatol nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku, a ponadto:

w astmie oskrzelowej i innych schorzeniach dróg oddechowych, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych, u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na zawartość etanolu oraz niepełne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, doustnie w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego, u osób z ciężkimi uszkodzeniami wątroby lub uzależnionych od alkoholu, na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i otwartych ranach, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błonę śluzową oraz w okolicach oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: Lek Aromatol zawiera etanol, częste stosowanie zewnętrzne może powodować podrażnienie i suchość skóry. Chronić oczy przed kontaktem z lekiem. W przypadku dostania się leku Aromatol do oczu, należy przemyć je obficie wodą i zwrócić się do lekarza. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości: trudności w oddychaniu (np. skurcz oskrzeli) należy niezwłocznie wezwać lekarza, a w przypadku wystąpienia zmian skórnych należy zasięgnąć porady lekarza. Po nacieraniu lekiem lub jego roztworem należy starannie umyć ręce. Nie należy stosować leku u osób z chorobą alkoholową. Lek zawiera 63,0 -72,0% (V/V) etanolu. Jeden mililitr leku zawiera ok. 0,57 g etanolu, 10 kropli zawiera etanol w ilości odpowiadającej około 2,2 ml wina o zawartości 12% (V/V) alkoholu lub około 5,3 łąpiwa o zawartości 5% (V/V) alkoholu, co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u dzieci i osób ze schorzeniami wątroby lub padaczką.

Dzieci Nie stosować leku u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Aromatol a inne leki Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Alkohol zawarty w leku może wzmacniać lub osłabiać działanie innych leków.

Ciąża i karmienie piersią Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na brak pełnej oceny bezpieczeństwa stosowania oraz zawartość etanolu, nie jest zalecane stosowanie leku u kobiet w ciąży i u karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Stosowanie leku może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aromatol:

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie zgłoszono przypadków przedawkowania leku Aromatol.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Aromatol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy, u osób wrażliwych, kontakt z olejkami eterycznymi może spowodować skórne odczyny uczuleniowe, a czasami także zaburzenia układu oddechowego (np. kaszel, skurcz oskrzeli).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław Informacja o leku tel. 22 742 00 22 e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

1 Charakterystyka Produktu Leczniczego AROMATOL, koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła, roztwór doustny, do stosowania na skórę i do sporządzania inhalacji parowej. Data zatwierdzenia 08.2016.

2 A. Kędzia: Aktywność olejku cynamonowego (Oleum Cinnamomi) wobec bakterii beztlenowych. Postępy Fitoterapii 1/2011 str. 3-4.

3 A. Kędzia i wsp.: Przeciwgrzybicze działanie olejku goździkowego. Postępy Fitoterapii 1/2014, str.26.

4 A. Walczak: O niezbędności profilaktyki malarii wśród polskich podróżnych. Probl Hig Epidemiol 2014, 95(1): 1-5.

5 M. Sienkiewicz i wsp.: Aktywność olejków tymiankowego i lawendowego wobec opornych na antybiotyki szczepów klinicznych *Pseudomonas aeruginosa*. Postępy Fitoterapii 3/2012.

6 J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska, J. Piotrkowska: Substancje aromatyzujące jako składniki herbatek ziołowo-owocowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 61, październik 2009, str. 28.

AROMATOL. Skład: 100 g roztworu zawiera: substancje czynne lewomentol 1,72 g, olejek cytrynowy 0,57 g, olejek z kory cynamonowca cejlońskiego 0,24 g, olejek mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu) 0,24 g, olejek lawendowy 0,24 g, olejek cytronelowy 0,1 g, olejek goździkowy 0,1 g. Zawartość etanolu 63,0 – 72,0 % (v/v). Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła, roztwór doustny, do stosowania na skórę i do sporządzania inhalacji parowej. Wskazania do stosowania: Zewnętrznie: w celu poprawy złego samopoczucia np. przy przeziębieniu, (do nacierania, do inhalacji lub płukania gardła), w bólach głowy, bólach mięśniowych, po ukąszeniach przez owady. Wewnętrznie: w dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych), np. wzdęciach, niestrawności. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, astma oskrzelowa i inne schorzenia układu oddechowego, którym towarzyszy silna nadwrażliwość dróg oddechowych. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat, ze względu na zawartość etanolu oraz niepełne dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności. Nie stosować wewnętrznie w przypadku niedrożności dróg żółciowych (np. w przebiegu kamicy żółciowej), zapalenia pęcherzyka żółciowego, u osób z ciężkimi uszkodzeniami wątroby lub uzależnionych od alkoholu. Nie stosować zewnętrznie na uszkodzoną skórę np. przy oparzeniach, wypryskach i otwartych ranach, przy chorobach skóry przebiegających z wysypką, na błonę śluzową oraz w okolicach oczu. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

2020_1001

Galeria



*Charakterystyka Produktu Leczniczego AROMATOL, bazująca na oparciu o dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania, została opracowana na podstawie danych z badań klinicznych. Wskazany do stosowania tylko u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Wskazany do stosowania tylko u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat. Wskazany do stosowania tylko u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.