

ASPIRIN C 20 tabletek musujących DELFARMA

Cena: 29,90 PLN



Opis słownikowy

Producent DELFARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu

Opis

ASPIRIN C szybko obniża gorączkę, zwalcza ból gardła, mięśni i głowy, a witamina C pomoże skrócić czas trwania choroby.

Działanie:

przeciwgorączkowe,

przeciwbólowe,

przeciwzapalne,

witamina C wzmacnia naturalną odporność organizmu, skraca czas trwania choroby.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pseudoefedrynę, kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy;

skaza krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; ciężka niekontrolowana niewydolność serca; w połączeniu z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych; ciężkie nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; jednoczesne stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminoooksydazy.

Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego:

Zaburzenia układu immunologicznego – reakcje nadwrażliwości (duszność, anafilaksja, reakcje skórne), zwłaszcza u pacjentów z astmą.

Zaburzenia żołądka i jelit – dolegliwości żołądkowo-jelitowe (ból żołądka, niestrawność, zapalenie żołądka); nudności, wymioty, biegunka; krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, smoliste stolce, nadżerkowe zapalenie żołądka), mogące w pojedynczych przypadkach prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza; wrzody trawienne żołądka i dwunastnicy, mogące w pojedynczych przypadkach prowadzić do perforacji. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych – zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego – zwiększenie ryzyka wystąpienia krwawienia.

Zaburzenia układu nerwowego oraz zaburzenia ucha i błędnika – zawroty głowy i szum w uszach mogą być objawami przedawkowania.

Możliwe działania niepożądane pseudoefedryny:

Zaburzenia naczyniowe – wzrost ciśnienia krwi, jednak nie w przypadku poddającego się leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Zaburzenia serca – wpływ na serce (np. częstoskurcz).

Zaburzenia układu nerwowego – pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego (np. bezsenność, rzadziej omamy).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych – zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej – wpływ na skórę (np. wysypka, pokrzywka, świąd).

Dawkowanie

Dorośli: doraźnie 1-2 tabl. (400-800 mg), maksymalnie 8 tabl. Dzieci od 10 r.ż.: 1 tabl. maksymalnie do 3 razy na dobę. Lek przyjmować doustnie po rozpuszczeniu w wodzie.

Skład

1 tabletkę musującą zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg kwasu askorbowego.