

ASPIRIN C 20 tabletek musujących



Cena: 24,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,4g+0,24g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.mus.
Producent	BAYER
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

WskazaniaASPIRIN C 20 tabletek musującychGdy poczujesz objawy przeziębienia lub grypy takie jak gorączka, ból głowy, bóle mięśniowe, czy ból gardła działaj szybko. Zastosuj Aspirin® C, lek który nie tylko zwalcza objawy przeziębienia i grypy, ale również zawiera wzmacniającą system odpornościowy witaminę C. Z Aspirin® C szybko wracasz do siebie i możesz dalej cieszyć się życiem oraz realizować swoje plany.**Działanie**Aspirin® C to lek w postaci tabletek musujących. Każda tabletkę zawiera substancje czynne: 400 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 240 mg kwasu askorbinowego (Acidum ascorbicum), bardziej znanego jako witamina C. Kwas acetylosalicylowy jest substancją aktywną o wszechstronnym działaniu, której głównym zadaniem jest hamowanie produkcji prostaglandyn. Te substancje przekąźnikowe zwiększają wrażliwość receptorów bólu. Gdy ich wytwarzanie zostaje zatrzymane, receptory bólu stają się mniej wrażliwe na bodźce, co powoduje złagodzenie uczucia bólu. Zahamowanie produkcji prostaglandyn powoduje również zmniejszenie stanu zapalnego. Dzięki temu Aspirin® C wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jak również przeciwgorączkowe. Lek zwalcza takie objawy przeziębienia i grypy jak:gorączkaból głowyból mięśnioweból gardłaDodatkowa zawartość witaminy C wzmacnia system odpornościowy.**Sposób użycia**Aspirin® C to lek w postaci tabletek musujących. Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić ją w szklance wody i wypić musujący płyn. Tabletkę musująca natychmiastowo uwalnia swoje substancje czynne, aby mogły zostać szybko przyswojone przez organizm. Aspirin® C zawiera również substancje buforowe, dzięki którym substancja czynna lepiej się rozpuszcza, a organizm szybciej dochodzi do siebie!Lek Aspirin® C rozpuszcza się w wodzie. Picie dużej ilości płynów jest bardzo wskazane podczas przeziębienia lub grypy.

Wiek	Pojedyncza dawka	Maksymalna dzienna dawka
M?odzie? powy?ej 12 r.?. wy??cznie na zlecenie lekarza	1 tabletkę musuj?ca	3 tabletkę musuj?ce

Dorośli

1–2 tabletki musujące

8 tabletek musujących

W razie potrzeby można przyjąć kolejną dawkę w odstępie 4–8 godzin.
Tabletki musujące Aspirin® C nie zawierają glutenu ani laktozy.

Ważne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. **Skład** Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum). Pozostałe składniki to: sodu cytrynian bezwodny, sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sodu węglan bezwodny.

Galeria

