

ASPIRIN C FORTE 10 tabletek musujących

CH-20221017-34

Cena: 24,49 PLN



Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Dawka | 0,8g+0,48g |
| Opakowanie | 10 tabl. |
| Postać | tabl.mus. |
| Producent | BAYER SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Lek |
| Substancja czynna | Acidum acetylsalic., Acidum ascorb. |

Opis produktu

WskazaniaASPIRIN C FORTE 10 tabletek musującychLek zwalcza takie objawy przeziębienia i grypy jak:gorączkaból głowyból mięśnioból gardłaDodatkowa zawartość witaminy C wzmacnia system odpornościowy.**Działanie**Aspirin® C Forte to lek w postaci tabletek musujących. Każda tabletkę zawiera substancje czynne: 800 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum) oraz 480 mg kwasu askorbinowego (Acidum ascorbicum), bardziej znanego jako witamina C. Kwas acetylosalicylowy jest substancją aktywną o wszechstronnym działaniu, której głównym zadaniem jest hamowanie produkcji prostaglandyn. Te substancje przekąźnikowe zwiększają wrażliwość receptorów bólu. Gdy ich wytwarzanie zostaje zatrzymane, receptory bólu stają się mniej wrażliwe na bodźce, co powoduje złagodzenie uczucia bólu. Zahamowanie produkcji prostaglandyn powoduje również zmniejszenie stanu zapalnego. Dzięki temu Aspirin® C Forte wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jak również przeciwgorączkowe.**Sposób użycia**Aspirin® C Forte to lek w postaci tabletek musujących. Przed zażyciem tabletkę należy rozpuścić ją w szklance wody i wypić musujący płyn. Tabletkę musującą natychmiastowo uwalnia swoje substancje czynne, aby mogły zostać szybko przyswojone przez organizm. Aspirin® C Forte zawiera również substancje buforowe, dzięki którym substancja czynna lepiej się rozpuszcza, a organizm szybciej dochodzi do siebie!Lek Aspirin® C Forte rozpuszcza się w wodzie, a picie duże ilości płynów jest bardzo wskazane podczas przeziębienia lub grypy.

| Wiek | Pojedyncza dawka | Maksymalna dzienna dawka |
|---------|---------------------|--------------------------|
| Doro?li | 1 tabletkę musuj?ca | 3 tabletki musuj?ce |

W razie potrzeby mo?na przyj?? kolejn? dawk? w odst?pie 4–8 godzin.

Tabletki musujące Aspirin® C Forte **nie zawierają glutenu ani laktozy.** Produktu Aspirin C Forte nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Ważne przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakiegokolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci i młodzież. **Skład** Substancjami czynnymi leku są: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) i witamina C (Acidum ascorbicum). Jedna tabletkę musująca zawiera 800 mg kwasu acetylosalicylowego i 480 mg kwasu askorbowego (witaminy C). Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan (modyfikowany): sodu wodorowęglan i sodu węglan, kwasy trynowy bezwodny, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna.

Galeria

