

ASPIRIN PRO 500 mg 20 tabletek

CH-20221017-34

Cena: 20,90 PLN



Opis słownikowy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

**Ból, gorączka,
stany zapalne**

**20
tabletek**

Opis produktu

WskazaniaASPIRIN PRO 500 mg 20 tabletek

objawowe leczenie w gorączce i (lub) bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu.

Technologia MicroActive® sprawia, że tabletki Aspirin® Pro działają szybciej niż kiedykolwiek. Jak to możliwe? Dzięki zmniejszeniu rozmiaru cząsteczek substancji czynnej leku o 90% i dodaniu środka przyspieszającego rozpad tabletki po jej przyjęciu, Aspirin® Pro rozpuszcza się 6 razy szybciej^{1,2} i zapewnia 2,5 razy szybsze^{1,2} wchłanianie substancji aktywnej do krwiobiegu. To sprawia, że zaawansowana technologicznie tabletki Aspirin® Pro działają dwa razy szybciej niż zwykła tabletki^{1,3}. Ból i gorączka zostaje zauważalnie złagodzony przy zachowaniu dobrej tolerancji, co potwierdzono badaniami klinicznymi. Dodatkowo każda tabletki powlekana Aspirin® Pro pokryta jest specjalną warstwą nadającą lekowi gładką powierzchnię. Dzięki temu tabletki jest łatwa do połknięcia i nie dostarcza nieprzyjemnych doznań w ustach¹. **Działanie** 1 tabletki zawiera 500 mg substancji czynnej - kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Jest to substancja czynna o wszechstronnym działaniu, której głównym zadaniem jest hamowanie produkcji prostaglandyn. Te substancje przekazywają zwiększają wrażliwość receptorów bólu. Gdy ich wytwarzanie zostaje zatrzymane, receptory bólu stają się mniej wrażliwe na bodźce, co powoduje złagodzenie bólu. Zahamowanie produkcji prostaglandyn powoduje również zmniejszenie stanu zapalnego. Dzięki temu Aspirin® Pro wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, jak również przeciwgorączkowe. **Sposób użycia** Aspirin® Pro to lek w postaci tabletek. Tabletki leku należy przyjmować doustnie, popijając dużą ilością płynu (najlepiej wodą). Każda tabletki Aspirin® Pro powlekana jest specjalną warstwą nadającą lekowi gładką powierzchnię co ułatwia jej połknięcie.

W razie potrzeby pojedynczą dawkę można powtórzyć po upływie 4 godzin. Tabletki Aspirin® Pro nie zawierają glutenu ani laktozy.

Ważne przeciwwskazania: uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; napady astmy oskrzelowej lub reakcja alergiczna (np. pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, ciężki nieżyt nosa, wstrząs) w wywiadzie, wywołane podaniem kwasu acetylosalicylowego lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ; choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy; skaza krwotoczna lub podwyższone ryzyko krwawienia; ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca; metotreksat w dawkach większych niż 20 mg na tydzień; doustne leki przeciwzakrzepowe; ciąża powyżej piątego miesiąca; dzieci poniżej 12 r.ż. bez przepisu lekarza. **Składniki** Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego. Pozostałe składniki leku to: krzemionka koloidalna bezwodna, sodu węglan bezwodny, otoczka tabletki: wosk Carnauba, hypromeloz, cynku stearynian. **Producent** Podmiot odpowiedzialny i wytwórca: Bayer Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 15802-326 Warszawa. Tel.: +48 22 572 35 00. Faks: +48 22 572 35 55. Wytwórca: Bayer Bitterfeld GmbH Ortsteil Greppin, Saiegaster Chaussee 106803 Bitterfeld-Wolfen Niemcy

Galeria

