

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło, 30 mg/ml, syrop

Wyciąg suchy z liścia babki lancetowatej

Plantaginis lanceolatae folii extractum siccum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło
3. Jak stosować lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło i w jakim celu się go stosuje

Lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło to tradycyjny lek roślinny stosowany w celu łagodzenia objawów podrażnienia jamy ustnej lub gardła i związanego z tym suchego kaszlu.

Lek jest tradycyjnym lekiem roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

Kiedy nie stosować leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

- jeśli pacjent ma uczulenie na babkę lancetowatą lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli podczas stosowania tego leku objawy ulegną nasileniu, u pacjenta wystąpi skrócony oddech, gorączka lub ropna płwocina (zażółcona flegma), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, przed zastosowaniem syropu Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Nie ustalono zaleceń dotyczących dawkowania u tych pacjentów.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na objawy wymagające porady lekarskiej oraz ze względu na brak odpowiednich danych.

Lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Jednakże nie zgłoszono żadnych interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania podczas ciąży nie zostało ustalone. Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy substancja czynna lub jej metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków i (lub) niemowląt karmionych piersią. Dlatego leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło zawiera maltitol ciekły (zawierający maltitol i sorbitol).

Ten lek zawiera do 225 mg sorbitolu w każdych 5 ml, co jest równoważne 45 mg/ml.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Lek może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna maltitolu ciekłego wynosi 2,3 kcal/g.

Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło zawiera etanol (alkohol)

Ten lek zawiera 78,5 mg alkoholu (etanol) w każdej jednostce dawkowania, co odpowiada 7,85 mg/ml (0,785 % (w/v)). Ilość alkoholu w 10 ml tego leku jest równoważna mniej niż 2 ml piwa lub 1 ml wina. Mała ilość alkoholu w tym leku nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

3. Jak stosować lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku
10 ml syropu trzy do czterech razy na dobę.

Dzieci w wieku od 5 do 11 lat
10 ml syropu trzy razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 3 do 4 lat
5 ml syropu trzy razy na dobę.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło u dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na objawy wymagające porady lekarskiej oraz ze względu na brak odpowiednich danych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Patrz punkt 2.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Do prawidłowego dozowania należy używać dołączonej miarki, stosując odpowiednie podziałki 2,5 i 5 ml.

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę.

Czas stosowania

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, lub jeśli objawy nie ustąpiły, należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

Dotychczas nie odnotowano objawów przedawkowania leku.

Pominięcie przyjęcia leku Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Dotychczas nie są znane.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301,

faks: + 48 22 49 21 309,

strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Podczas przechowywania może wytworzyć się osad. Nie ma to wpływu na jakość produktu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C po pierwszym otwarciu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności („EXP”) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło

- Substancją czynną jest wyciąg suchy z liścia babki lancetowatej. Każdy ml syropu (co odpowiada 1,2 g) zawiera 30 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z liścia babki lancetowatej (*Plantago lanceolata* L., folium) (DER 3-5:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 20% (m/m).
- Pozostałe składniki to: maltodekstryna, maltitol ciekły (E 965), guma ksantan (E 415), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy (E 330), naturalny aromat miód-cytryna-werbena (zawiera etanol), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Strepsils Natur kaszel suchy i podrażnione gardło i co zawiera opakowanie

Syrop jest brązowym płynem o charakterystycznym zapachu, pakowanym w butelki o pojemności 100 lub 200 ml. Butelki są pakowane w pudełka tekturowe zawierające ulotkę informacyjną dla pacjenta i miarkę.

Wielkości opakowań: 100 ml i 200 ml. Miarka ma dwie różne skale z podziałką 2,5 i 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. (22) 211 26 92

Wytwórca

Phytopharm Kłęka S.A.
Kłęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polska

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria	StrepHustan Hustenstiller 30 mg/ml Sirup
Belgia	Strephoest 30 mg/ml siroop

Bułgaria	StrepTuss Active Naturals Plantain 30 mg/ml, syrup СтрепТус Актив Нечъралс Живовляк 30 mg/ml сироп
Chorwacja	Streptusan sirup
Czechy	Strevox
Dania	StrepHost Tør
Estonia	Septils
Finlandia	Streptus Dry
Francja	STREPSILS TOUX SECHE PLANTAIN 30 mg/ml, sirop
Grecja	StrepCough Plantain
Hiszpania	Streptos llantén 30 mg/ml jarabe
Holandia	Strephoest 30 mg/ml siroop
Islandia	StrepHost Tør
Litwa	SEPTILS sirupas
Łotwa	SEPTILS sīrups
Niemcy	Dobendan Hustenstilller
Norwegia	Streplieve
Portugalia	Streptosse Active Naturals Tosse Seca xarope
Rumunia	StrepTuss pătlagină 30 mg/ml sirop
Słowacja	Strevox
Słowenia	Streptusan sirup
Szwecja	Streplieve
Węgry	Streptuss 30 mg/ml szirup
Włochy	Benactuss Tosse Secca E Emolliente Gola

Data ostatniej aktualizacji ulotki: