

## AULINDOL żel 0,03 g/g 50 g

Cena: 13,75 PLN



### Opis słownikowy

Dawka	0,03 g/g
Opakowanie	50 g (tuba)
Postać	żel
Producent	ANGELINI PHARMA POLSKA SP. Z O.O
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Nimesulidum

**W leczeniu bólu**  
przy skręceniu stawów i przy  
urazowym zapaleniu ścięgien

**LEK**  
**żel 50 g**

AD/farol/03/22

### Opis produktu

**Wskazania**AULINDOL żel 0,03 g/g 50 gAulinDol jest stosowany w celu łagodzenia bólu i obrzęków spowodowanych:skręczeniami,urazami ścięgien zwanymi „ostrymi urazowymi zapaleniami ścięgien”.Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.**Działanie**Lek AulinDol zawiera substancję czynną nimesulid, należącą do niesteroidowych leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym (NLPZ).**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecana dawkaPotrzebna ilość żelu zależy od rozmiarów bolesnego lub obrzękniętego miejsca.Zazwyczaj stosuje się 3 g żelu (co odpowiada 6 – 7 cm żelu wyciśniętego z tubki).Stosować żel 2 lub 3 razy na dobę.Lek stosować od 7 do 15 dni. Jeżeli objawy nie ulegną poprawie po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.W przypadku wątpliwości dotyczącej ilości leku jaką należy użyć, zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Sposób stosowaniaWmasować lek w bolesne i obrzęknięte miejsce. Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.**Ważne**Nie stosować żelu w okolicy oczu. W razie kontaktu leku z oczami należy je przemyć czystą wodą.**Skład**Substancją czynną leku jest nimesulid. 1 g żelu zawiera 30 mg nimesuliduPozostałe składniki to: glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makrogoliglicerydów kaprylokaproniany, karbomery, disodu edetynian, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), trietanolamina i woda oczyszczona.Lek AulinDol zawiera:Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) i propylu parahydroksybenzoesan (E 216). Mogą one powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).Te reakcje mogą pojawić się natychmiast lub po kilku dniach.

## Galeria

**AulinDol**  
Nimesulidum



- żel z nimesulidem do stosowania miejscowego
- ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe<sup>1</sup>
- lepszy efekt kosmetyczny – nie zawiera alkoholu\*

\*Charakterystyka produktu leczniczego: AulinDol  
A01N040322

**AulinDol**  
Nimesulidum



**Jeden lek dla wielu...**  
w leczeniu bólu związanego ze skręceniem stawów i urazowym zapaleniem ścięgien.



Lek OTC  
A01N040322

**AulinDol** Dawkowanie i sposób podawania u dorosłych



Odmierzyc dawkę żelu (zazwyczaj 3g, co odpowiada 6-7cm wyciśniętego żelu)



Nanożyć cienką warstwę żelu na bolące miejsce, wcierając do całkowitego wchłonięcia



Powtórzyć 2-3 razy na dobę



Czas trwania leczenia: 7 do 15 dni

A01N040322

**AulinDol**  
Nimesulidum



**Dostępne dwie wielkości opakowania: 50 g i 100 g**



A01N040322