


AXOPROFEN FORTE 400 mg 20 tabletek

Cena: 6,19 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,4 g
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.
Producent	ARISTO PHARMA SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

WskazaniaAXOPROFEN FORTE 400 mg 20 tabletekDorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej).Krótkotrwałe objawowe leczenie:- Bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego- Gorączki.**Działanie**Lek zawiera ibuprofen, który należy do grupy leków zwanej: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które działają poprzez zmniejszanie bólu, stanu zapalnego i gorączki.**Sposób użycia**Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów.Dorośli i młodzież o masie ciała ≥ 40 kg (w wieku 12 lat i powyżej):Dawka początkowa to 200 mg lub 400 mg ibuprofenu. Jeśli to konieczne, można przyjąć dodatkowo 200 mg lub 400 mg.Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami należy ustalić w zależności od obserwowanych objawów oraz z uwzględnieniem maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin. Nie należy przekraczać całkowitej dawki 1 200 mg w ciągu 24 godzin.Produkt leczniczy Axopropfen Forte stosuje się tylko w leczeniu krótkotrwałym.Podanie doustne.Axopropfen Forte należy przyjmować, popijając szklanką wody.Aby uniknąć podrażnienia żołądka lub gardła, tabletek nie należy kruszyć, żuć ani ssać.Zaleca się, aby pacjenci z wrażliwym żołądkiem przyjmowali produkt leczniczy Axopropfen Forte w trakcie posiłków.**Ważne**Przeciwwskazania- Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.- Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (tj. skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).- Pacjenci z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA).- Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek.- Pacjenci z niewyjaśnionymi zaburzeniami wytwarzania krwi.- Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub nawracająca) w wywiadzie lub krwotoki z przewodu pokarmowego (zdefiniowane jako dwa lub więcej epizodów owrzodzenia lub krwawienia).- Krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja w wywiadzie związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.- Pacjenci z krwawieniem mózgowo-naczyniowym lub innym czynnym krwawieniem.- Pacjenci z ciężkim odwodnieniem (np. spowodowanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym przyjmowaniem płynów).- Ostatni trymestr ciąży**Skład**Każda tabletkowa powleczka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).Tabletkę można podzielić na równe dawki po 200 mg.Rdzeń tabletki: Hypromeloza, Kroskarmeloza sodowa, Laktoza jednowodna, Celuloza mikrokrystaliczna, Skrobia żelowana, kukurydziana, Krzemionka koloidalna bezwodna, Sodu laurylosiarczan, Magnezu stearynian,Otoczka tabletki: Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Talk, Glikol propylenowy