


# BISACODYL VP 5 mg 30 tabletek dojelitowych IMPORT INPHARM

Cena: 10,70 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	5 mg
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.dojelit.
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Bisacodylum

## Opis produktu

**Wskazania**Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopia, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).**Działanie**Przeczyszczające i wiatropędne.**Sposób użycia**Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: doustnie, 5mg do 10mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc). Dzieci w wieku od 4 do 10 lat: doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc). Dzieci w wieku poniżej 4 lat: nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie wiekowej. Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.**Ważne**Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu, zespół ostrego brzucha, bóle brzucha o nieznannej etiologii z obecnością nudności i wymiotów, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie, dzieci do 4 lat.**Skład**1 tabletkę dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu (Bisacodylum). Rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna. Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwien koszenilowa (E124) lak, symetykon.