

## Bobolen Syrop na kaszel suchy od 1 r.ż., 115ml



Cena: 17,01 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	115 ml
Postać	syrop
Producent	POLSKI LEK
Rodzaj rejestracji	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

### Opis produktu

#### Opis

**Wskazania:** Bobolen syrop na suchy kaszel przeznaczony jest do łagodzenia suchego kaszlu przy nieżytach dróg oddechowych oraz podrażnieniach błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Bobolen syrop na suchy kaszel przeznaczony jest dla dzieci powyżej 1 roku życia i dorosłych. Dzieciom poniżej 1 roku życia syrop można podawać tylko po konsultacji z lekarzem. **Właściwości:** W skład syropu wchodzi glicerol oraz ekstrakt z prawoślazu zawierający substancje śluzowe, które działają powlekająco i osłaniająco na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Bez dodatku: cukru, barwników, aromatów. Do produktu dołączona jest pipeta, umożliwiająca precyzyjne odmierzanie zalecanej porcji.

#### Zalecane spożycie

**Dzieci w wieku:** powyżej 6 miesięcy: 1-2 ml - 4 razy w ciągu doby od 1 roku do 3 lat: 3 ml - 4 razy w ciągu doby od 3 roku do 6 lat: 4 ml - 4 razy w ciągu doby od 6 do 12 lat: 5 ml - 5 razy w ciągu doby **Dorośli i młodzież:** Od 12 lat: 10 ml 3-6 razy w ciągu doby

#### Składniki

glicerol, ekstrakt z korzenia prawoślazu DER 3-4:1 (0,55% m/m). Pozostałe składniki: syrop maltitolowy, sok jabłkowy, woda oczyszczona, benzoesan sodu.

#### Ważne

Zastosowanie zbyt dużych ilości może mieć efekt przeczyszczający. Nie stosować w przypadku stwierdzonego uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować w przypadku zespołu złego wchłaniania fruktozy lub wrodzonej nietolerancji fruktozy (fruktozemia) ze względu na obecność syropu maltitolowego. Nie stosować po upływie terminu ważności. Stosować zgodnie z instrukcją użycia. Nie używać jeśli uszkodzone jest opakowanie bezpośrednie. Nie używać z innymi preparatami podawanymi doustnie. Produkt może być w razie potrzeby stosowany przed dłuższy czas. Jednak w przypadku braku poprawy bądź

nasileniu objawów po 3 dniach stosowania należy zasięgnąć porady lekarza.