


CALCIUM POLFARMEX syrop o smaku truskawkowym 150 ml



Cena: 9,25 PLN

Opis słownikowy

Producent	POLFARMEX
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

Opis

Profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu, hiperkalcemia, hiperkalciuria, niewydolność nerek znacznego stopnia.

Uwaga

Może wykazywać działanie niepożądane u chorych na cukrzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu. Ostrożnie stosować u osób z nadczynnością tarczycy, chorobami serca, sarkoidozą, kamicą nerkową.

Interakcje z innymi lekami inne rodzaje interakcji

Nasilenie działania sulfonamidów, glikozydów naparstnicy, zaburzenie wchłaniania tetracyklin i związków fluoru. Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia. Witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża lub laktacja

Wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane

Duże dawki mogą powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia). Długotrwałe stosowanie może być przyczyną hiperkalcemii lub hiperkalciurii.

Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować zaburzenia układu pokarmowego: nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia. W przypadku przedawkowania należy podawać siarczan magnezu.

Dawkowanie

Doustnie.

Dzieci w wieku od 2 do 11 lat – 2,5 ml do 5 ml dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku od 12 do 17 lat – 5 ml do 10 ml dwa do trzech razy na dobę.

Dorośli – 15 ml dwa do trzech razy na dobę.

Skład

100 ml syropu zawiera 29,4 g wapnia glubionianu (Calcii glubionas) oraz 6,4 g wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas).

Substancja pomocnicza: sacharoza 30 g/ 100 ml.