

CALPEROS VITA-D3 500 + 2000 IU 30 tabletek do rozgryzania i żucia



Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka	500mg+2 000I.U.
Opakowanie	30 tabl.
Postać	tabl.do rozgryz.i żucia
Producent	TEVA B.V.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Calcium carbonicum, Witamina D

Opis produktu

WskazaniaLek stosowany jest w leczeniu niedoboru wapnia i witaminy D u osób dorosłych.Substancja czynna: Calcium, Cholecalciferolum**Działanie**Lek Calperos Vita-D3 stanowi połączenie mineralnego wapnia i cholekalcyferolu, znanego również jako witamina D3. Substancje te są ważne w procesie tworzenia się kości.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Zalecane dawkowanieDorośli, w tym osoby w podeszłym wieku, przyjmują 1 tabletkę do rozgryzania i żucia na dobę, co odpowiada 500 mg wapnia i 2000 IU (jednostek międzynarodowych) witaminy D3.Przed przyjęciem leku Calperos Vita-D3 konieczne może być zastosowanie leku zawierającego wyższą dawkę witaminy D3 bez wapnia w celu uzyskania pożądanego poziomu witaminy D3. Lekarz rozpocznie takie leczenie w zależności od ciężkości choroby i odpowiedzi pacjenta na leczenie.Dzieci i młodzieżZe względu na wysoką zawartość witaminy D3 Calperos Vita-D3 nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.Sposób podawaniaTabletkę należy żuć, a następnie połknąć. Można ją przyjmować o dowolnej porze, najlepiej z posiłkiem.Należy zwrócić uwagę na dostateczne dobowe spożycie wapnia w diecie (tj. w produktach mlecznych, warzywach i w wodzie mineralnej), ponieważ lek Calperos Vita-D3 dostarcza jedynie około połowy wymaganego dobowego zapotrzebowania na wapń.Czas trwania leczeniaLek Calperos Vita-D3 należy przyjmować przez dłuższy czas. Należy poradzić się w tej sprawie lekarza.**Ważne**PrzeciwwskazaniaKiedy nie stosować leku Calperos Vita-D3jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia),jeśli pacjent ma duże stężenie wapnia w moczu (hiperkalciuria),jeśli u pacjenta stwierdzono nadczynność przytarczyc (hiperparatyroidyzm),jeśli pacjent choruje na raka szpiku kostnego (szpiczak),jeśli pacjent choruje na raka, który dał przerzuty do kości,jeśli pacjent ma ograniczone ruchy kończyn (przedłużające się unieruchomienie), któremu towarzyszy hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria,jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową,jeśli w nerkach pacjenta stwierdzono obecność złogów wapnia (wapnica nerek),jeśli pacjent przyjmuje za duże ilości witaminy D (hiperwitaminoza D),jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek.**Skład**Substancjami czynnymi leku są wapń i cholekalcyferol (witamina D3).Każda tabletkę do rozgryzania i żucia zawiera 500 mg wapnia (w postaci węglanu) oraz 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2000 IU witaminy D3 (w postaci koncentratu cholekalcyferolu w postaci proszku).Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), ksylitol (E 967), sorbitol (E 420), kwas cytrynowy, monosodu cytrynian, magnezu stearynian, karmeloza sodowa, aromat pomarańczowy "CPB" (zawierający substancje aromatyzujące pochodzenia naturalnego, mannitol, maltodekstrynę,

glukonolakton, sorbitol, glikol propylenowy, alkohol benzyłowy), aromat pomarańczowy "CVT" (zawierający substancje aromatyzujące, mannitol, maltodekstrynę, glukonolakton, sorbitol oraz triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha), krzemionka koloidalna uwodniona, aspartam (E 951), acesulfam potasowy (E 950), sodu askorbinian, all-rac- α -tokoferol, skrobia kukurydziana modyfikowana, sacharoza, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna bezwodna.