


CARBO ACTIV AFLOFARM 200 mg 20 kapsułek

Cena: 5,90 PLN



Opis słownikowy

Producent	AFLOFARM
Rodzaj rejestracji	Lek

Opis produktu

WskazaniaLek stosuje się w następujących chorobach i dolegliwościach:zatrucia pokarmowebiegunkiwzdęciatzatrucia lekami i substancjami chemicznymi (w porozumieniu z lekarzem)**Działanie**Lek Carbo Activ Aflofarm w postaci kapsułek twardej zawiera sproszkowany leczniczy węgiel aktywny, substancję o silnych właściwościach adsorbcyjnych. Po przyjęciu leku, węgiel aktywny uwalnia się z kapsułki w ciągu kilkunastu minut i adsorbuje na swojej znacznie rozbudowanej powierzchni substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym toksyny bakteryjne, utrudniając ich wchłanianie z przewodu pokarmowego; zatrzymuje też na swojej powierzchni drobnoustroje (bakterie, grzyby). **Sposób użycia**Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **Zalecana dawka**Dorośli i dzieci powyżej 12 latW lżejszych zatruciach pokarmowych z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej podaje się doustnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.**W cięższych przypadkach biegunkizawartość 15 do 30 kapsułek** wysypać do niewielkiej ilości wody i przyjmować w postaci zawiesiny co godzinę do ustąpienia objawów (3 lub 4 razy).**W przypadku zatruc chemicznych i w zatruciach lekami**przyjąć niezwłocznie 10 kapsułek węgla, popijając wodą, a następnie powtórzyć tę dawkę kilkakrotnie. Natychmiast zawiadomić lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.**W cięższych zatruciach**podaje się jednorazowo 4 g do 10 g węgla aktywnego (zawartość 20 do 50 kapsułek) w postaci zawiesiny w wodzie. Zawiesinę można podawać sondą żołądkową podczas płukania żołądka.**Dzieci powyżej 1 roku życia**W przypadku zatruc lekami lub substancjami chemicznymi podaje się zwykle jednorazowo 10 do 20 kapsułek.**Dla dzieci poniżej 6. roku życia** należy zawartość kapsułek wsypać do niewielkiej ilości wody i podać w postaci zawiesiny.**Sposób podawania**Lek należy stosować doustnie. Leku nie należy przyjmować razem z posiłkiem.**Ważne**Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe jest wystąpienie zaparcia. W takim przypadku należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów BiobójczychAl. Jerozolimskie 181 C02-222 WarszawaTel.: + 48 22 49 21 301Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: ndl@urpl.gov.plDziałania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemuDzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku. **Składniki**Substancją czynną leku jest węgiel aktywny. Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus). Pozostałe składniki to: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).