

## CETIGRAN 10 mg 10 tabletek, lek na alergię

Cena: 4,99 PLN



### Opis słownikowy

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Dawka              | 0,01 g           |
| Opakowanie         | 10 tabl.         |
| Postać             | tabl.powl.       |
| Producent          | AXXON SP. Z O.O. |
| Rodzaj rejestracji | Lek              |
| Substancja czynna  | Cetirizinum      |

### Opis produktu

**Wskazania** CETIGRAN 10 mg 10 tabletek Cetigran jest lekiem przeciwalergicznym zawierającym cetyryzynę, która zaczyna działać już po 1 godzinie od podania. Wskazany w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Cetigran jest wskazany zarówno u dorosłych, jak i u dzieci od 6 roku życia. Mała, podzielna tabletki gwarantuje dopasowanie optymalnej dawki. **Działanie** Substancją czynną leku Cetigran jest cetyryzyny dichlorowodorek. Cetigran jest lekiem działającym przeciwalergicznie. **Sposób użycia** Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. **3** Lek należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody. Tabletkę można podzielić na równą dawkę. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat Zalecana dawka leku to 10 mg (1 tabletki) raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat Zalecana dawka leku to 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę). Inne postacie tego leku mogą być bardziej odpowiednie dla dzieci. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie 5 mg raz na dobę. Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, należy zwrócić się do lekarza, który odpowiednio dostosuje dawkę. Jeśli u dziecka występuje choroba nerek, należy zwrócić się do lekarza, który dostosuje dawkę do potrzeb dziecka. W przypadku wrażenia, że działanie leku Cetigran jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Czas trwania leczenia Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu objawów. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Leczenie cetyryzyną bez zalecenia lekarza nie powinno trwać dłużej niż 10 dni. **Ważne** Kiedy nie stosować leku Cetigran: - jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirens kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min); - jeśli pacjent ma uczulenie na cetyryzyny dichlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków). **Skład** Substancją czynną leku jest cetyryzyny dichlorowodorek. Jedna tabletki powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoru. - Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, magnez stearynian. Skład otoczki Opadry II White: laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol 3000, glicerol trioctan, tytanu dwutlenek.