

DIATHER Glukoza, 75g (v8)

Cena: 3,31 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	75 g (saszet.)
Postać	pr.do p.rozt.doust.
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rodzaj rejestracji	Dietetyczny środek spożywczy
Substancja czynna	Glucosum

Opis produktu

Opis Diather Glukoza w proszku – preparat przeznaczony do wykonania doustnego testu obciążenia glukozą

Preparat przeznaczony do wykonania doustnego testu obciążenia glukozą – test OGTT (ang. Oral Glucose Tolerance Test; dawniej: krzywa cukrowa), również do stosowania w stanach niedoboru węglowodanów, w stanach wyczerpania, hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą. Produkt przeznaczony jest dla osób w każdym wieku.

Test wykonuje się u osób, u których podejrzewa się cukrzycę typu 2. Na badanie należy udać się na czczo (minimum po 8 godzinach od ostatniego posiłku). Test rozpoczyna się pobraniem próbki krwi żyłnej celem oznaczenia stężenia glukozy na czczo, następnie należy wypić w ciągu 3-5 minut 75g glukozy rozpuszczonej w 200-300ml wody i po upływie 60 (test trzypunktowy) i 120 minut (test dwupunktowy) ponownie pobiera się próbkę krwi żyłnej celem oznaczenia glikemii. Dwugodzinny okres pomiędzy wypiciem roztworu glukozy, a pobraniem krwi osoba badana powinna spędzić w spoczynku.

Produkt przeznaczony jest również do stosowania w stanach niedoboru węglowodanów, w stanach wyczerpania oraz hipoglikemii u pacjentów z rozpoznaną cukrzycą. W przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii należy przyjąć 10-20g glukozy. Spowoduje to wzrost glikemii po około 10 – 20 minutach. W celu uniknięcia ponownego incydentu hipoglikemii należy spożyć węglowodany złożone, a pomiar glikemii powtórzyć po 60 minutach. U chorych leczonych metodą intensywnej insulinoterapii, z zastosowaniem analogów insuliny lub podczas leczenia za pomocą osobistej pompy insulinowej, w przypadku hipoglikemii należy przyjąć 15 g glukozy doustnie i skontrolować glikemię po 15 minutach. Jeśli nadal utrzymuje się niska wartość glikemii, należy powtórzyć badanie glukozy i skontrolować stężenie glukozy we krwi po kolejnych 15 minutach (reguła 15/15). Uwaga: ¼ saszetki to około 17 g glukozy.

Sposób użycia

1 saszetkę 75g rozpuścić w szklance wody (200-300ml), wypić w ciągu 3-5 min

Składniki

glukoza

Wartość odżywcza:	100 g produktu	1 saszetka (75g)
Energia	1700kJ / 400 kcal	1275 kJ / 300 kcal
Białko	0 g	0 g
Węglowodany	100 g	75 g
w tym cukry	100 g	75 g
Tłuszcze	0 g	0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone	0 g	0 g
Błonnik	0 g	0 g
Sól	0 g	0 g

Producent

DIATHER