

DICLOGEL żel 0,01 g/g 100 g

Cena: 7,30 PLN



Opis słownikowy

Dawka	0,01 g/g
Opakowanie	100 g
Postać	żel
Producent	FORTIS PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Diclofenacum

Opis produktu

WskazaniaDiklofenak działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo w leczeniu:łagodnego do umiarkowanego bólu mięśniokontuzyjibólu pourazowego.Lek Diclogel jest przeznaczony do stosowania u dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 14 lat.**Działanie**Lek Diclogel jest żelem zawierającym 10 mg diklofenaku sodowego w każdym gramie żelu.Diklofenak jest pochodną kwasu fenylooctowego i należy do grupy leków znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Działanie jego polega na zahamowaniu aktywności cyklooksygenazy, a następnie na zahamowaniu syntezy prostaglandyn i innych mediatorów stanu zapalnego.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 latNależy aplikować cienką warstwę żelu Diclogel na zmienione miejsca 3 do 4 razy na dobę, w zależności od potrzeby (około 2 do 4 gramów, ilość odpowiadająca wielkości owocu wiśni do rozmiarów orzecha włoskiego) i wcierać delikatnie.Okres leczenia zależy od wskazań i od reakcji na leczenie. Zaleca się ocenę leczenia po 7 dniach od rozpoczęcia.Jeżeli ból i obrzęk nie ustępują w ciągu 7 dni lub nastąpi nasilenie objawów, należy skontaktować się z lekarzem.Nie należy stosować leku Diclogel dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.Diclogel może być stosowany jako dodatkowe leczenie podczas doustnego przyjmowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.Dzieci i młodzież w wieku poniżej 14 latLeku Diclogel nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat, ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów (patrz punkt 2. Kiedy nie stosować leku Diclogel).Zaburzenia czynności wątrobyNie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.Stosowanie u osób w podeszłym wiekuNależy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych.Sposób podawaniaPodanie na skórę.Po nałożeniu należy umyć ręce, chyba, że to one są leczone.Należy aplikować wyłącznie na zdrową skórę.W razie przypadkowego kontaktu z lekiem DiclogelW przypadku kontaktu leku z oczami, błonami śluzowymi (na przykład w jamie ustnej) lub obszarami uszkodzonej skóry, należy opłukać dotknięty obszar bieżącą wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.W razie przypadkowego spożycia leku DiclogelW razie przypadkowego poknięcia leku Diclogel należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy pamiętać o zabraniu opakowania leku.Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DiclogelDiklofenak jest bardzo słabo wchłaniany do krwiobiegu, dlatego przedawkowanie jest mało prawdopodobne. W razie zastosowania nadmiernej ilości leku Diclogel należy zebrać jego nadmiar.**Ważne**Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Diclogel i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)nadwrażliwość, która jest rodzajem reakcji alergicznej objawiającej się wysypką skórną z pęcherzykami lub bez pęcherzyków (wykwity skórne z zaczerwienieniem), pokrzywką, dusznością i trudnością w

połykaniu;świszczący oddech, duszność lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma);obrzęk szczególnie twarzy, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy).Ryzyko wystąpienia tych reakcji jest większe na początku leczenia.Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób)wysypka skórnazaburzenia skóry (wyprysk)zaczerwienienie skóry (rumień)zapalenie skóry w miejscu aplikacji objawiające się wysypką, obrzękiem lub grudkami (zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry)swędzenie skóry (świąd)Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 osób)rozległe zmiany na skórze z pojawieniem się zaczerwienienia, łuszczenia i dużych pęcherzyków (pęcherzowe zapalenie skóry)Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 osób)wysypka skórna z pęcherzami wypełnionymi ropą (wysypka krostkowa)zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne (reakcja nadwrażliwości na światło)Częstość nieznanauuczucie pieczenia w miejscu zastosowania lekusuchość skóryDługotrwałe stosowanie leku Diclogel na dużej powierzchni ciała może powodować działania niepożądane również w innych obszarach ciała poza skórą, takie jak:nudnościwymiotybiegunkabóle brzucha**Skład**Co zawiera lek DiclogelSubstancją czynną leku jest diklofenak sodowy. 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), triglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, karbomer 980, hydroksyetyloceluloza, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218) oraz woda oczyszczona.