

DicoStop, 4 saszetki KRÓTKA DATA 28.02.2025



Cena: 7,19 PLN

Opis słownikowy

| | |
|--------------------|-----------------|
| Opakowanie | 4 saszetki |
| Producent | VITIS PHARMA |
| Rodzaj rejestracji | Suplement diety |

Opis produktu

OpisPRODUKT Z KRÓTSZĄ DATĄ WAŻNOŚCI. DATA WAŻNOŚCI PRODUKTU 28.02.2025 DicoStop - do stosowania podczas biegunki

Płynny wyrób medyczny w saszetce, do jednorazowego użytku, w ostrych i przewlekłych biegunkach i dolegliwościach bólowych związanych z zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego.

Diosmektyt zawarty w preparacie **DICOSTOP** łączy się z glikoproteinami warstwy śluzowej pokrywającej ścianę przewodu pokarmowego, zmieniając ich charakterystykę fizyczną, tworząc chłonny żel, który chroni przed nadmiernym wydzielaniem kwasu i substancjami drażniącymi żołądek, a także stanowi barierę przeciw mechanizmom zapalnym.

Sposób użycia

Dorośli: 1 saszetka 3 razy dziennie **Dzieci w wieku 6-12 lat:** 1 saszetka 2-3 razy dziennie **Dzieci w wieku 2-6 lat:** 1 saszetka 1-2 razy dziennie

Każda saszetka może być użyta tylko raz po jej otwarciu. Energicznie ugnieść zawartość saszetki przed jej otwarciem. Produkt może być przyjmowany bezpośrednio lub rozpuszczony w szklance wody lub w innych napojach (sok, jogurt). Po otwarciu, zawartość saszetki powinna być przyjęta w całości, produkt jest jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu nie mogą być przyjęte później w ciągu dnia. W przypadku małych dzieci, zawartość saszetki można podać w butelce do karmienia, po zmieszaniu z 50 ml wody lub innego napoju, **podzieloną na 2-3 dawki w ciągu dnia**. Możliwe jest także dodanie preparatu DICOSTOP do pokarmów półpłynnych. Doradza się przyjmowanie preparatu DICOSTOP pomiędzy posiłkami. W leczeniu ostrej biegunki należy stosować doustny płyn nawadniający (DPN) w celu uniknięcia odwodnienia.

Składniki

Jedna saszetka DICOSTOP zawiera: Składnik aktywny: diosmektyt (1,5 g). **Substancje pomocnicze:** woda oczyszczona, EDTA, guma karaya, metyloparaben sodowy, estry sacharozy i kwasów tłuszczowych, aromaty, kwas cytrynowy, benzoosan sodowy, sukraloza.

Ważne

- Wyrób przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Energicznie ugnieść saszetkę przed użyciem.
- Nie stosować dłużej niż 10 kolejnych dni.
- Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli u dzieci biegunka utrzymuje się przez dłużej niż 3 dni, należy zwrócić się po poradę medyczną.
- Nie przyjmować wyrobu w pozycji leżącej.
- Nie stosować wyrobu po dacie ważności podanej na pudełku i saszetce.
- Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.
- Każda saszetka jest jednorazowego użytku i powinna być otwarta wyłącznie tuż przed jej zastosowaniem; nie należy ponownie używać saszetek częściowo zużytych, ponieważ może się to wiązać z ryzykiem nieskuteczności roztworu lub skażenia preparatu DICOSTOP.
- Nie przekraczać zalecanej dawki, w przypadku działań niepożądanych (zaparcie, bóle jelit, wzdęcia) przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku nieoczekiwanych działań niepożądanych, innych niż te wymienione powyżej, należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku uszkodzeń żołądka lub jelit lub w przewlekłym zaparciu lub podrażnieniu i niedrożności jelit.
- Wyrób medyczny zawiera aluminium pochodzące z diosmektytu; jeżeli stosowane są inne produkty lub leki zawierające diosmektyt, glinę lub związek aluminium, należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem preparatu DICOSTOP.
- Nie stosować tego wyrobu medycznego podczas używania innych wyrobów lub leków doustnych: zdolność chłonna diosmektytu może niekorzystnie wpływać na ich skuteczność. W przypadku stosowania równoczesnych terapii lekowych, przed przyjęciem preparatu DICOSTOP należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania i ograniczenia stosowania:

Nie stosować wyrobu medycznego u dzieci przed ukończeniem drugiego roku życia. Nie stosować wyrobu w przypadku znanej nadwrażliwości na składniki tego wyrobu medycznego. Nie stosować wyrobu medycznego u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

PRZECHOWYWANIE

DICOSTOP nie powinien być stosowany po dacie ważności podanej na opakowaniu. DICOSTOP należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C); unikać ekspozycji na bezpośrednie źródła światła, ciepło i nadmierną wilgotność.

Podmiot odpowiedzialny: VITIS PHARMA