Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

DIOSMAX 1000 mg 60 tabletek OLIMP

Cena: 47,95 PLN

Opis słownikowy

Dawka	1 g
Opakowanie	60 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	OLIMP LABORATORIES
Rodzaj rejestracji	Lek
Substancja czynna	Diosminum

Opis produktu

WskazaniaDIOSMAX 1000 mg 60 tabletek OLIMPleczenie objawów występujących w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, takich jak: obrzęki, uczucie zmęczenia, ból i ciężkość nóg, pieczenie, nocne kurcze oraz poszerzanie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw. „pajączki”);objawowe leczenie żylaków kończyn dolnych;zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidów).Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza**Działanie**DiosMax zawiera zmikronizowaną diosminę, należącą do grupy substancji zwanych bioflawonoidami.Diosmina zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych oraz działa osłaniająco na naczynia.Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, przez co przyczynia się do poprawy krążenia żylnego. Zwiększa drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę (ruchy) naczyń chłonnych i przepływ limfy oraz poprawia powrót krwi z układu żylnego oraz zmniejsza zastój żylny i (lub) nadciśnienie w kończynach dolnych. Diosmina zmniejsza też przepuszczalność małych naczyń krwionośnych – ogranicza stany zapalne, zwłaszcza w zapaleniach okołożylnych. Poprzez przywrócenie naczyniomwłosowatym prawidłowej przepuszczalności zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.**Sposób użycia**Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnychZalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej 4 do 5 tygodni.Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytuZalecana dawka to 1 tabletka 3 razy na dobę przez pierwsze 4 dni leczenia, a następnie jedna tabletka 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DiosMaxW razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.Pominięcie przyjęcia leku DiosMaxNie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.**Ważne**Nie zaleca się stosowania produktów leczniczych zawierających diosminę w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.**Skład**OLIMP Laboratories Sp. z o.o.Pustynia 84 F39-200 Dębica